

19
Aus dem veterinär-anatomischen Institut der Universität Giessen.
(Prof. Dr. Paul Martin.)

ZUR ENTWICKELUNG UND EINTEILUNG DES KLEINHIRNES DER HAUSSÄUGER.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

FRITZ FREITAG

approb. Tierarzt aus Hüttchen (Kreis Czarnikau).

GIESSEN 1906

Hof- und Universitäts-Druckerei Otto Kindt, Giessen.

Aus dem veterinär-anatomischen Institut der Universität Giessen.
(Prof. Dr. Paul Martin.)

ZUR ENTWICKELUNG UND EINTEILUNG DES KLEINHIRNES DER HAUSSÄUGER.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

FRITZ FREITAG

approb. Tierarzt aus Hüttchen (Kreis Czarnikau).

GIESSEN 1906

Hof- und Universitäts-Druckerei Otto Kindt, Giessen.

Gedruckt mit Genehmigung der vereinigten medizinischen Fakultät
der Universität Giessen.

Referent: Prof. Dr. Martin.

Dem Andenken meiner lieben Eltern
gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bei der Beschreibung des Säugetierkleinhirns folgen die meisten Autoren der Einteilungsart, welche auf das menschliche Kleinhirn angewendet wird. Sie teilen dementsprechend das Kleinhirn ein in den Wurm und die beiden Hemisphären und benutzen die tiefen Furchen der Oberfläche, um Unterabteilungen festzustellen. Einige Forscher (Flatau, Jacobsohn, Bradley) nehmen, wenigstens bei den höheren Säugetieren, soviel Hauptabteilungen an, wie beim Kleinhirne des Menschen, andere zählen deren weniger, indem sie zwei oder mehrere Lappen des menschlichen Kleinhirns zu einem solchen des Säugetierkleinhirns zusammenfassen.

Um das Verständnis der verschiedenen Arten der Einteilung zu erleichtern, habe ich eine Tabelle (S. 34—39) angefertigt, aus welcher man ersehen kann, welche Namen von den verschiedenen Forschern für die einzelnen Kleinhirnteile gebraucht wurden. Die Tabelle beweist wie notwendig es ist, hier einen anderen Zustand zu schaffen, welcher diese Verwirrung beseitigt.

Bei der nun folgenden Darstellung der Literatur bitte ich die halbschematischen Abbildungen Fig. 7—17 ständlg benutzen zu wollen. Die Einteilung des menschlichen Kleinhirns setze ich als bekannt voraus und übergehe der Kürze halber deren Darstellung, da jedes Lehrbuch der Menschenanatomie hierüber Auskunft gibt.

Flatau und Jacobsohn stellten in ihrer Anatomie des Zentralnervensystems der Säugetiere fest, daß ohne Zwang eine Homologie zwischen den einzelnen Teilen des Cerebellum in der ganzen Reihe der Säugetiere nachzuweisen ist. Nachdem sie das Kleinhirn verschiedener Säugetiere analog der Einteilung des menschlichen Kleinhirns zergliedert haben, kommen sie in ihrer „Zusammenfassung“ zu der Ansicht, daß die Teilung des Wurmes in Ober- und Unterwurm unzweckmäßig sei, da die Furche, welche gewöhnlich das Kleinhirn des Menschen in diese beiden Teile trennt, der Sulcus horizontalis magnus, beim Kleinhirn der Säugetiere inkonstant und wenig charakteristisch ist und den Wurm häufig gar nicht erreicht, sondern sich auf die Seitenteile des Kleinhirns beschränkt. Sie legen das Hauptgewicht auf eine andere, tiefe und konstante Furche, den Sulcus superior anterior der Menschenanatomie, welcher auch von anderen Forschern festgestellt wurde und von Stroud Sulcus furcalis, von Kuithan Sulcus primarius cerebelli, von Smith Fissura prima genannt wird (Fig. 6—8, I). Da das Kleinhirn einerseits durch diese Furche, andererseits durch das Zelt in einen vorderen und hinteren Abschnitt geteilt wird, so schlugen Flatau und Jacobsohn für diese Teile die Bezeichnung Vorder- und Hinterwurm (Fig. 7—17 A a—d und B a—e) vor.

Die Lingula (Fig. 7—10 Aa) scheint nach ihnen bei allen Säugetieren, wenigstens so weit man es makroskopisch beurteilen kann, vorzukommen. Mit Ausnahme der ganz kleinen Tiere haben sie dieselbe überall nachweisen und erkennen können.

Ferner halten sie es für unrichtig und wenig übersichtlich, zwischen Declive und Tuber vermis zu unterscheiden, da die Trennungsfurche zwischen diesen Teilen nur flach ist. Sie machen deshalb den Vorschlag, diese beiden, von einem typischen Markstrahle versorgten Teile

zu einem Lappen unter dem Namen Tuber vermis zusammenzufassen (Ba—b), ähnlich Ziehen's Lobus impendens der niederen Säugetiere.

Die Bezeichnung Paraflocculus anderer Autoren scheint Flatau und Jacobsohn unbekannt zu sein. In dem Teile des Kleinhirns, den die anderen Forscher Paraflocculus nennen (Fig. 11—17 II u. III, glauben sie den Lobulus cuneiformis erblicken zu müssen.

Bei den Carnivoren und Ungulaten sind, wie sie sagen, wahrscheinlich Tonsille und Flocke (Fig. 11—16 IV) zu einem kleinen Läppchen verschmolzen. Beim Pferde hingegen scheint nach ihrer Ansicht der Paraflocculus ventralis anderer Forscher (Fig. 17 III) der Tonsille zu entsprechen. Sie haben scheinbar die Verbindung der beiden Teile des Parafl., die beim Pferde undeutlich ist, übersehen.

In feiner Schrift „On the Cerebellum of the horse“ sucht Bradley das Kleinhirn des Pferdes analog dem menschlichen Kleinhirn zu zergliedern.

Fig. 1.





Fig. 2.



Schema der Kleinhirnanlage nach Bradley.

Er stellt außerdem folgende Verbindungen der Hämipärententeile und des Wurmes fest: „Der Lobulus in-

ferior posterior, inferior semilunaris (Fig. 11–17, I c) und gracilis anterior gehen in ein gemeinsames Band über, nur der Lobulus superior posterior (Fig. 11–17, I b') ist allein mit dem Folium cacuminis (Fig. 11–17, B a) verbunden, da die beiden übrigen Lobi verbunden sind mit dem Folium cacuminis (B a) und Tuber valvulae (B b). Der Lobus gracilis posterior (Fig. 11–17, I c') ist mit dem Tuber valvulae mittelst eines besonderen Bandes verbunden.

Beim Menschen ist die Art der Verbindungen der gleichnamigen Teile eine von der oben angeführten ganz verschiedene, sodaß sich auch hierbei die Unzulänglichkeit des Vergleiches des Säugetierkleinhirns mit dem des Menschen offenbart. Bradleys Lobus biventer (Fig. 17, I c'') ist der mittlere, mit Blättern versehene Teil der Copula pyramidis (Smith), eines Bandes, das Pyramis (B c) und Paraflocculus dorsalis (II) (Smith) verbindet. Die Verbindung seines Lobus biventer mit dem Paraflocculus dorsalis läßt Bradley unerwähnt. Seine Tonfille fehlt meist. Am Schlusse seiner Schrift macht Bradley Angaben über die Tiefe der Hauptfurchen.

In seiner späteren Schrift „The Mammalian Cerebellum“ veröffentlichte Bradley die Ergebnisse seiner Untersuchung über die Entwicklung der Homologien der Kleinhirnfurchen. Die einfachste Form des Kleinhirns wurde als Ausgangspunkt angenommen und die Teile dieser einfachen Form bei den höher entwickelten Kleinhirnen gesucht. Er benutzte keine schon bestehenden Namen für die Lappen und Furchen, sondern bezeichnete die Lappen mit Buchstaben und die Furchen mit Zahlen. Das einfachste Kleinhirn besitzt 5 Lappen, die er von vorne nach hinten mit A, B, C, D und E bezeichnete. Die zwischen diesen Lappen liegenden Fissuren nennt er I, II, III u. IV. Fissur II ist die tiefste und entspricht dem Sulcus furcalis (Stroud) dem Sulcus primarius cerebelli (Kuithan) und der Fissura prima (Smith). (Vergl. Fig. 1 u. 2.)

Bradley untersuchte die Entwicklung dieser Teile zunächst beim Kaninchen, bei dem die fünf Lappen verhältnismäßig einfach sind.

Die Hauptfurchen erschienen zeitlich in der Reihenfolge IV, II, III, I. (Außer diesen Hauptfurchen treten noch andere Furchen auf.) Gleichzeitig mit II beginnt jederseits vom lateralen Rande eine Einfenkung, die allmählich den zukünftigen Paraflocculus vom übrigen Teile der Hemisphäre trennt, sich schließlich mit III vereinigt und so anzeigt, daß der Paraflocculus der laterale Teil vom Lobus D ist (f. Schema Fig. 2). Lobus E steht mit dem Flocculus durch das Velum medullare posterius in Zusammenhang.

Die nächste Furche, die erscheint, und die Bradley c nennt, teilt Lobus A in 2 Unterabteilungen A_1 und A_2 (Fig. 1 u. 2). Bald nach c erscheinen am lateralen Teil des Kleinhirns jederseits ein paar Furchen, genannt a und b. Die beiden Teile von Furche a verschmelzen allmählich in der Mittellinie, ebenso später die von Furche b. Dadurch wird Lobus C in die Lobuli C_1 , C_2 und C_3 geteilt (f. Fig. 1 u. 2).

Etwas komplizierter ist das Kleinhirn des Eichhörnchens. Bemerkenswert ist davon, daß sich der Hemisphärenteil von Lobulus C_3 nach vorn und hinten ausdehnt. Eine Furche d teilt den Lobus D in die Lobuli D_1 und D_2 . Der Paraflocculus ist vergrößert und seine Blätter sind in 2 Reihen, Paraflocculus dorsalis und ventralis nach Stroud, angeordnet, deren obere mit Lobulus D_1 zusammenhängt.

Beim Ferkel konnte Bradley außer der Verbindung zwischen Lobulus D_1 und Paraflocculus dorsalis auch eine solche zwischen Lobulus D_2 und Paraflocculus ventralis feststellen. Letztere verschwand später wieder. Beim Kleinhirn des Pferdes konnten aber noch Spuren desselben nachgewiesen werden. Die Verbindung des Lobulus D_1

mit dem dorsalen Paraflocculus bleibt hingegen bei den Säugetierkleinhirnen erhalten.

Dann prüft Bradley die Entwicklung des Kleinhirns von einigen Schafsembryonen:

Bei einem 68 mm langen Schafsembryo, der dem 64 mm langen des Schweines entspricht, fand er die Furchen II, IV und d, von denen sich die erste am weitesten lateral ausdehnt. Am lateralen Teil des Kleinhirns fand er eine Furche, die er nach der folgenden Entwicklung als Furche a feststellen konnte.

Ein 87 mm langer Schafsembryo läßt schon Furche III, I und c erkennen. Es sind bereits die Andeutungen von Wurm und Hemisphären vorhanden. Furche IV hat sich seitlich bis zur Grenze des Kleinhirns ausgedehnt, wo sie sich nach vorn und unten umbiegt, um die Anlage des Flocculus zu umschreiben. (Dieser Zustand wurde auch beim Kaninchen und Schwein gefunden.)

Der 100 mm lange Schafsembryo zeigt nichts Neues, nur sind die vorigen Furchen besser sichtbar.

Das Kleinhirn eines 114 mm langen Schafsembryos zeigt besonders in seinem vorderen Teil starke Entwicklung. Furche b ist in der Mittellinie erschienen. Der Paraflocculus beginnt sich zu teilen.

Das Kleinhirn des 163 mm langen Schafsembryos ist bereits dem des erwachsenen Schafes auffallend ähnlich. Lobulus D₁ ist mit dem Paraflocculus dorsalis verbunden. Das Verbindungsband hat quere Blätter. Lobus E erstreckt sich über die Grenze des Wurms hinaus, verschwindet auf eine kurze Strecke und erscheint beim Flocculus wieder. Der Paraflocculus ist in einen dorsalen und ventralen Teil geschieden und hat quere Blätter. An den Wurmteilen der Lobuli C₃ und besonders C₂ ist infolge des starken Wachstums in sagittaler Richtung eine Verdrehung eingetreten.

Beim 138 mm langen Rinderembryo ist bemerkenswert, daß die Furche, welche den Paraflocculus in einen Paraflocculus dorsalis und ventralis teilt, vorn am tiefsten ist und sich deshalb vermutlich von vorn nach hinten eingesenkt hat.

Kleinhirn des erwachsenen Rindes: Am Hemisphären- teil des Lobulus C₂ ist eine bedeutende Größenzunahme vorhanden begleitet von einer Änderung in der Richtung der intralobulären Furchen. Sein Wurmteil ist infolge starken sagittalen Wachstums in sich selbst gebogen und hat den Wurmteil von Lobulus C₃ nach beiden Seiten verdrängt. Der mittlere Teil von Furche a verläuft in fast vollständig sagittaler Richtung. Auch die Blätter des Lobus

D sind durch sagittales Wachstum aus ihren querer Anordnung gedrängt. Lobulus D₁ ist mit dem Paraflocculus dorsalis verbunden. Die Trennung des Paraflocculus in einen dorsalen und ventralen Teil ist nicht so deutlich wie bei den Embryonen.

Beim Pferdeembryo dehnt sich die Furche d lateral aus und teilt ähnlich wie beim Schwein den Paraflocculus in einen Paraflocculus dorsalis und ventralis. Beim Rind und vielleicht auch beim Schaf tritt am Paraflocculus eine selbständige Furche auf, die sich nach Furche d hinzieht und mit ihr verschmilzt.

Im zweiten Teil seiner Arbeit, der 1904 erschienen ist, setzt Bradley seine Kleinhirnstudien fort, und zwar beschäftigt er sich hier nur mit dem Menschen und Affen.

Er beschreibt zuerst die Kleinhirne verschiedener Affen von den einfachsten bis zu den höchsten Formen hinauf und kommt dabei zu der Annahme, daß der Paraflocculus der Affen übereinstimmt mit dem ventralen Teil des Paraflocculus bei der Mehrzahl der Säugetiere, und daß der dorsale Paraflocculus sozusagen gebildet worden ist durch den vergrößerten Hemisphärenteil von Lobulus D₂.

Hierauf folgt die Beschreibung einiger embryonalen menschlichen Kleinhirne und die Identifizierung seiner Zahlen und Buchstaben mit den Bezeichnungen der Menschen-Anatomie. Dieselbe ergibt folgendes (vergl. Fig. 1 u. 2):

c = Sulcus postcentralis (Fissura praeacuminata Smith),

A₂ + B = Lobus culminis,

II = Sulcus praeclivalis,

a = Sulcus horizontalis magnus,

III = Sulcus postpyramidalis,

C₁ = Lobus Clivi = Clivus monticuli + Lobi lunati posteriores,

C₂ = Lobus Cacuminis = Folium cacuminis + Lobus postero-superior,

C₃ = Lobus Tuberis = Tuber valvulae + Lobi semilunares inferiores + Lobulus gracilis anterior + Lobulus gracilis posterior,

$D_1 = \text{Pyramis} + \text{Lobi biventrals},$

$D_2 = \text{Lobus Uvulae} = \text{Uvula} + \text{Tonsillae},$

$E = \text{Lobus Noduli} = \text{Nodulus} + \text{Flocculus}.$

Die Lingula sieht Bradley nicht als besonderen Lobus an, da sie bei den meisten Tieren fehlt und bei den höheren Tieren nicht einmal innerhalb derselben Tierart konstant ist.

Die Lemurs gehören, was das Kleinhirn anbetrifft, nicht zu den Anthropoiden.

Am Schlusse der Arbeit folgt eine Zusammenfassung. Bradley betont die Wichtigkeit der Furche II, die eine Einteilung des Kleinhirns in 2 Lobi rechtfertigen könnte. Er hält es aber für besser 5 Lobi anzuerkennen. Lobus E zeigt die geringste, C und D die größte Formveränderung. A und B bleiben erst in der Entwicklung zurück. Dann kommt eine Periode der Aktivität, in der sie die übrigen Lobi weit hinter sich lassen. Furche a beginnt ihre Existenz an den Hemisphären, b scheint entweder an den Hemisphären (Schwein und Kaninchen), oder am Wurm (Schaf) zu beginnen. b reicht fast stets über das ganze Kleinhirn, a bleibt häufig aus zwei lateralen Segmenten bestehen.

Kuithan hat in seiner Schrift „Die Entwicklung des Kleinhirns bei den Säugetieren“ die Bildung des Organes beim Schaf und Menschen verfolgt. Im ersten Abschnitte seiner Arbeit beschreibt er die Entwicklung des Kleinhirns von seiner ersten Anlage bis zum Beginn der Furchenbildung. Ich gehe daher nur auf den zweiten Abschnitt der Arbeit ein, welcher sich mit der weiteren Ausbildung des Kleinhirns von Beginn der Furchenbildung an beschäftigt. Kuithan legt bei der Einteilung des Kleinhirns großes Gewicht auf jene konstante tiefe Furche, die von Bradley II, von Stroud Sulcus furcalis, von Smith Fissura prima genannt wird. Er bezeichnet sie, weil sie zuerst von allen Furchen des

Kleinhirns erscheint, als *Sulcus primarius cerebelli*. Zunächst betont er die Bedeutung des *Sulcus horizontalis magnus*, welcher zuerst an den Hemisphären auftritt und von allen Furchen dort am tiefsten ist. Die beiden Hemisphärentteile dieser Furche vereinigen sich allmählich am Wurm und trennen Teile, die dem *Folium cacuminis* und *Tuber valvulae* entsprechen. Er benützt den *Sulcus primarius* und den *Sulcus horizontalis magnus*, um das Kleinhirn der Säugetiere in 3 Lappen einzuteilen. Er nennt dieselben Vorder-, Mittel- und Unterlappen. Der Vorderlappen schließt ein den *Lobulus centralis* (Ab,) und *Culmen monticuli* des Wurmes (Ac, d), sowie die *Alae lobuli centralis* und *Lobi lunati anteriores* (Ia) der Hemisphären. Der Mittellappen umfaßt *Declive Monticuli* (Ba) und *Folium cacuminis* des Wurmes, sowie die *Lobi lunati posteriores* (Ib, b') und *Lobi semilunares posteriores* (Ic) der Hemisphären. Der Unterlappen enthält *Tuber valvulae* (Bb), *Pyramis* (Bc), *Uvula* (Bd) und *Nodus* (Be) des Wurmes, sowie die *Lobi semilunares inferiores* (Ic'), *Lobi cuneiformes* (II u. III) und *Tonsillae* (IV) der Hemisphären.

Obwohl nun aber Kuithan am Schlusse seiner Arbeit diese Einteilung vorschlägt, spricht er beim Kleinhirn des Schafes nur von einem Vorder- und Hinterlappen, die durch den *Sulcus primarius cerebelli* getrennt werden. Der Hinterlappen besteht nach Kuithan aus dem Wurm, den beiden *Vermes laterales* (I), sowie den verhältnismäßig sehr großen Flocken (II, III, IV)¹⁾

Aus dem, was er über die Entwicklungsgeschichte des *Paraflocculus* und *Flocculus* berichtet, ist anzunehmen, daß ihm die Homologie dieser Teile nicht klar war. Er sagt

¹⁾ Die genaue Homologie der seitlichen Lappen Kuithans mit denen unseres Schemas läßt sich aus den Angaben Kuithans nicht mit aller Sicherheit ersehen. Unsere in Klammer gesetzten Vergleiche treffen aber am meisten zu.

nur folgendes: „Am lateralen Rande des Kleinhirns, wo es in die *Crura cerebelli ad pontem* übergeht, entstehen mehrere selbständige Wucherungen, welche mit kurzen Stielen aufliegen. Es sind dies die *Flocculi*. Zwischen ihnen und den Hemisphären bildet sich eine Gruppe von kurzen Windungen, welche zusammen die Gestalt eines Wurmes haben, weshalb ich sie *Vermis lateralis* nennen will.“

Bei der Entwicklung des Kleinhirns beim Schafe stellt er die Reihenfolge fest, in der die Hauptfurchen erscheinen. Die erste Furche ist der *Sulcus primarius cerebelli*. Die nächste Furche reicht über das ganze Kleinhirn und trennt in der Mitte den *Nodus* vom übrigen Kleinhirn ab. Sie kann auch gleichzeitig mit der erstgenannten auftreten. Vor dieser Furche erscheint dann eine kurze Furche, die vorne die *Uvula* begrenzt. Die 4. Furche scheidet *Pyramis* und die gemeinsame Anlage des *Declive* und *Tuber vermis*. Darauf erhält der Vorderlappen des Kleinhirns (bei 9 cm langen Embryonen) 3—4 Quersfurchen. — Bei 11 cm langen Schafembryonen fängt der hinter der Primärfurche gelegene Teil des Organes an, sich in drei Längszonen stärker zu verdicken. So entstehen Wurm und Hemisphären. Am lateralen Rand entstehen selbständige Wucherungen, die *Flocculi*. Zwischen ihnen und den Hemisphären bildet sich eine Gruppe von kurzen rundlichen Windungen, *Vermis lateralis*. — Bei 18 cm langen Embryonen fällt unter den Windungen in der gemeinsamen Anlage des *Declive* und *Tuber vermis* eine tiefe Furche auf, welche diese Anlagen in die genannten Hauptwindungen zerlegt. In der Gegend des *Tuber vermis* entsteht infolge starken sagittalen Wachstums dieser Gegend eine S-förmige Krümmung, die vorn nach links, hinten nach rechts offen ist. — Eine *Lingula* ist beim ausgetragenen wie beim erwachsenen Schaf vorhanden.

Ähnlich wie beim Schafe fand Kuithan die Entstehung der Hauptfurchen des menschlichen Kleinhirns.


Künnemann läßt in seiner Arbeit „Über die Morphologie des Kleinhirns bei den Säugetieren“ die bisher angewandten Methoden der Einteilung des Kleinhirns außer Acht und bringt einen neuen Einteilungsmodus, ohne die bisher üblichen Bezeichnungen anzuwenden. Während er bei den *Marsupialia*, *Rodentia* und *Prosimii* das Kleinhirn in drei Lappen, Vorder-, Hinter- und Unterlappen teilt, macht er bei den *Chiroptera*,

Insectivora, Carnivora und Artiodactyla zwei Unterabteilungen — Lobus superior und posterior. Er erkennt die Berechtigung, zwischen Wurm und Hemisphären zu unterscheiden, an, doch sind sie bei der Kaße kaum getrennt.

Bei der erstgenannten Gruppe von Säugetieren teilt er den Wurmteil des Mittellappens ein in einen Lobus anticus und posticus. Der Seitenteil des letzteren steht häufig mit der Flocke in Verbindung. Den Hemisphärenteil des Lobus anticus teilt er in einen vorderen und hinteren Lappen — Lobus arcuatus und Lobus alatus. Am Unterlappen unterscheidet er zwei Unterabteilungen, die er weiter nicht benennt.

Am Lobus posterior der zweiten Gruppe der Säugetiere (Chiroptera, Insectivora, Carnivora und Artiodactyla) unterscheidet er 5 Abschnitte mit 4 Furchen, von denen nur die hinterste einigermaßen tief ist. Deshalb meint er, kann man den letzten Abschnitt nicht mit Unrecht als ein Homologon des „Unterlappens“ der Marsupialia und Rodentia auffassen. An die drei vorderen Abschnitte des Wurmes des Lobus posterior schließen sich jederseits 3 seitliche Teile an, die von ersteren durch seitliche sagittale Furchen getrennt sind. Der 4. Abschnitt verläuft quer über die ganze Breite des Kleinhirns. Die ersten 4 Abschnitte gehen seitlich in einen der Flocke der Nagetiere analogen Lappen über.

Fig. 3.



Schema der Kleinhirneinteilung von Künnemann.

Am Lobus superior der Carnivoren (Aa—d und Artiodactyla) unterscheidet er 3 Unterabteilungen, die

vielleicht jenen des Menschen entsprechen. Den Lobus posterior teilt er in 4 Abschnitte, Lobus primus (Ba und Ib), secundus (Bb), tertius (Bc) und quartus (Bd—Be). Den Hemisphärenteil des S-förmigen Lobus secundus nennt er Lobus recurvatus (Ib', c). Am Lobus tertius unterscheidet er einen Lobus tertius medius (Bc), lateralis (Ic') und externus (IIa—c und IIIa—c). Letzterer entspricht dem Paraflocculus der übrigen Autoren. Der Lobus quartus (Bd—Be) ist in zwei Unterabteilungen geschieden, von denen die erstere sich lateral nicht ausdehnt, während die letztere mit dem Lobus Flocculus unendlich verbunden ist. Letzterer (IV) wird von den anderen Forschern einfach Flocculus genannt im Gegensatz zum Lobus Flocculi, der Flocculus + Paraflocculus entspricht.

Ein dem Lobus lunatus anterior des Menschen homologer Lappen fehlt dem Fleischfresser.

Am Schlusse macht Künnemann einige Angaben über die Entwicklung des Kleinhirns der Katze und Feldmaus.

Bei einer Breite von 0,7 cm besitzt das Kleinhirn der Katze 4 Furchen, von denen die 2. über das ganze Kleinhirn reicht und es in einen Lobus superior und posterior zerlegt. Letzterer wird scheinbar durch die 3. und 4. Furche in den Lobus primus, tertius und quartus geteilt. Seitlich verbreitet sich der Lobus posterior, sowohl nach vorne, als auch nach hinten, durch zwei Vorwölbungen, welche eine zur Brücke laufende Furche trennt.

Bei einem Kleinhirn von 0,8 cm Länge zeichnen sich am Lobus superior 2 Furchen durch größere Tiefe aus, sodaß der Oberlappen nun drei gut abgegrenzte Unterabteilungen aufweist. Seitlich vom Lobus tertius ist eine Hervorwölbung, der Lobus tertius lateralis, entstanden, der sich etwas vom Lobus tertius durch eine Längsrinne absetzt. Der vordere seitliche Wulst wird durch eine über das ganze Kleinhirn reichende Querfurche in eine vordere und hintere Abteilung geschieden, die den Lobus primus und secundus darstellen. Die andere seitliche Hervorragung, die Anlage des Lobus tertius externus, wird durch eine Querfurche in einen vorderen größeren und hinteren kleineren Teil geschieden. Es sind bereits am ganzen Kleinhirn sekundäre Furchen aufgetreten.

Bei einem Kleinhirn von 0,9 cm Breite erscheint die Anlage der Furchen und Windungen vollendet. Durch Verschieben des Lobus tertius lateralis auf den Lobus secundus ist der letztere auseinander-gewichen, sodaß man jetzt einen medialen und einen lateralen Abschnitt des Lobus secundus zu unterscheiden hat. Der seitliche Abschnitt ist der Lobus recurvatus. Der Lobus tertius externus ist am meisten nach vorn und seitwärts geschoben. Mit diesem Stadium ist die Gliederung des Kleinhirns vollendet.

Elliot Smith bringt in feinen drei Schriften: „The Primary Subdivision of the Mammalian Cerebellum“, „Notes on the Morphologie of the Cerebellum“ und „Further Observations on the Natural Mode of Subdivision of the Mammalian Cerebellum“ eine neue Einteilung des Säugetierkleinhirns und gibt auf Grund sehr eingehender Studien über verschiedene strittige Punkte Aufschluß. Er ist der Ansicht, daß genaue Vergleiche zwischen den verschiedenen Teilen des Kleinhirns bei allen Säugetieren aufgestellt werden können, weil das Organ bei jedem Säugetier durch eine Reihe von fundamentalen Fissuren geteilt wird, deren Homologie bei allen anderen erkannt werden kann.

Er teilt zunächst das Kleinhirn in 2 Lobi Flocculi (Schema II, III und IV) und in eine „interfloccular mass“ ein. Letztere ist wieder zusammengefügt aus drei Lappen, die von einander durch die Fissura prima (von Kuithan Sulcus primarius cerebelli, von Stroud Sulcus furcalis genannt) und die Fissura secunda getrennt werden. Die Lappen heißen Lobus anticus (Fig. 11–17, Aa–d), medius (in der ersten Schrift centralis genannt) und posticus (zusammen Ba–e). Letzterer wird durch die am Kleinhirn zuerst auftretende Fissura postnodularis in Uvula und Nodus (Bd und Be) geschieden. Der Lobus anticus zerfällt in die Pars lingualis (Aa), Pars praeculminata (Lobus centralis der anderen Autoren, (Ab) und Pars culminata (Ac, d) Am Lobus medius sind gewöhnlich vier Unterabteilungen sichtbar, die am Wurm gewöhnlich Declive, Folium cacu-

minis, Tuber valvulae und Pyramis (Ba—c) genannt werden. Jeder Lobus Flocculi, der vom Reste des Kleinhirns durch die Fissura parafloccularis geschieden wird, wird durch die Fissura floccularis in den eigentlichen Flocculus (IV) und den Paraflocculus (II u. III) zerlegt. Letzterer ähnelt einem Anneliden und besteht fast immer aus einem dorsalen (II) und ventralen (III) Teil. Große Aufmerksamkeit schenkt Smith der Fissurenbildung am Lobus medius und den Verbindungen des Lobus posticus und medius mit dem Flocculus.

Der Lobus medius (Ba—c) breitet sich seitlich stark aus und bildet die Hemisphären.

Am vorderen Teile der Hemisphären entsteht jederseits eine Fissur, welche die Area lunata (Ib) hinten abgrenzt. Der Teil hinter der Fissura lunata bildet bei der Mehrzahl der Säugetiere, mit Ausnahme der meisten Ungulaten, Sirenia und der kleinsten Säugetiere, eine wirbelförmige Anordnung von Blättern und wird deshalb Area pterioidea (Ib') genannt. Der übrige Teil der Hemisphären, der durch die Fissura postpteroidea von den vorhergehenden Teilen getrennt wird, heißt Paravermis (Ic, c') und wird durch die Fissura parapyramidalis in eine Area postpteroidea (Ic) und Area parapyramidalis (Ic') geschieden. Die Fissurae postlunatae vereinigen sich häufig in der Mittellinie und begrenzen mit der Fissura prima am Wurm das Declive (Ba). Die Fissurae postpteroideae fließen nur selten in der Mittellinie zusammen und entsprechen dem Sulcus horizontalis magnus. Falls sie sich vereinigen, was nur bei höheren Tieren geschieht und selbst beim Menschen nicht immer, dann begrenzen sie am Wurm hinten das Folium cacinis. Wegen dieser Unregelmäßigkeit eignet sich nach Smith der Sulcus horizontalis magnus nicht zu einer Hauptteilungsfurche.

Die Fissura suprapyramidalis, die sich zwischen Tuber valvulae und

Pyramis befindet, fließt mit den Fissurae parapyramidales beim Menschen, den Affen und den meisten Lemurs zusammen. Oft aber vereinigt sie sich mit anderen Fissuren, gewöhnlich mit der Fissura parafloccularis.

„Ähnlich kann die Fissura secunda, welche gewöhnlich nach abwärts biegt, um die Uvula vom Reste des Kleinhirns abzuschneiden in mehr lateraler Richtung verlängert sein und mit der Fissura floccularis oder parafloccularis oder eben, wie es gewöhnlich beim menschlichen Kleinhirn der Fall ist, mit der Fissur im Paravermis, Fissura posttonsillaris genannt, zusammenfließen.“

Den Mangel der Erkenntnis dieser gänzlich mechanischen, für die Fissurenbildung so einschneidenden Erscheinung, macht Smith für die Verwirrung verantwortlich, die für die Versuche, das menschliche Kleinhirn mit den gewöhnlichen Typen des Säugetierkleinhirns zu vergleichen, charakteristisch ist.

Smith fand an sagittalen Serien Schnitten durch das Kleinhirn von *Notoryctes* folgendes: Der Nodus läuft seitlich in ein schmales Band von Stratum granulosum aus, genannt Ala noduli. Dann trennt sich am Lobus medius ein zweites Granularband, die Copula pyramidis (Ic'') vom Stratum granulosum des Restes des Kleinhirns, ab und geht in den Paraflocculus (Fig. 11—17, II und III) über, während die Ala noduli im Flocculus (Fig. 11—17, IV) endigt. Durch das ungetrennte Stratum granulosum des Lobus Flocculi sind diese beiden Bänder also lateral vereinigt. Der Lobus Flocculi ist mit dem Lobus posticus nur durch die Ala noduli und mit dem Lobus medius durch die Copula pyramidis verbunden.

Bei allen Ordnungen werden nach Smith durch unregelmäßige Verschmelzungsarten der verschiedenen Furchenelemente Anomalien hervorgerufen. So kann aus rein mechanischen Gründen der Paraflocculus mit der Uvula verbunden sein, wie es beim Kleinhirn des Menschen der Fall ist. Deshalb bestreitet Smith die Zugehörigkeit des Paraflocculus zu einem bestimmten Teile des Wurms. Die Tonsilla, der am meisten ventral gelegene Teil des Paravermis, steht mit der Uvula beim Menschen im Zusammenhang. Diese Verbindung fehlt bei den ägyptischen Fellachen, bei denen die Blätter der Ton-

sille nach aufwärts in vollständigem Zusammenhang mit den ventralen Blättern der Pyramis verlängert sind.

Bei allen großen Säugetieren dehnt sich die Area pteroidea gewaltig aus und engt die Area postpteroidea und parapyramidalis derart ein, daß sie ein wurmähnliches Band (Paravermis) bilden. Die Blätter desselben können mit denen des Paraflocculus durch schiefe Stellung der untersten Blätter in ununterbrochenem Zusammenhang stehen. So scheinen, wie Smith sagt, Paravermis und Paraflocculus aus einer langen, wurmähnlichen Reihe von Blättern zu bestehen. Die Scheidung des zwischen Fissura prima und Fissura pyramidalis gelegenen Teils des Wurms in Declive, Folium cacuminis und Tuber valvulae empfiehlt Smith zu ignorieren.

Bertram Brennette Stroud sagt in feiner Schrift „The Development of the Cerebellum in Man and the Cat“: Der Unterschied zwischen dem menschlichen Kleinhirn und den anderen Kleinhirnen ist einfach ein Fall von Verschiedenheit auf der Stufe der Entwicklung.

Stroud benutzt als Hauptgrenzen bei der Einteilung des Kleinhirns die sagittalen Furchen und unterscheidet demnach einen Wurm, zwei Pilea (I), zwei Paraflocculi (II und III) und zwei Flocculi (IV). Jeder Paraflocculus wird durch eine Intrafloccularfurche in einen Supraflocculus (II) (dorsal) und einen Mediflocculus (III) (ventral) geteilt. Wurm und Pilea teilt er weiter ein in Pre- und Postramus, letzteren in Pre- und Postpileum. Dem Preramus gehören Lingula, Lobus cephalicus, Lobus centralis und Culmen mit ihren seitlichen Ausdehnungen an. Beim Menschen bildet Clivus mit seinen lateralen Teilen das Prepileum, bei der Katze Clivus, Cacumen und Tuber mit ihren lateralen Teilen. Zum Postpilum gehören die übrigen Teile. Die Trennungsfurche zwischen Pre- und Postpileum nennt Stroud beim Menschen Sulcus peduncularis, bei der Katze Sulcus interpilearis.

Ziehen veröffentlichte im Jahre 1897 ein Werk über „das Zentralnervensystem der Monotremen und Marsupialier“. Er beschränkte sich größtenteils auf eine Beschreibung derselben und konnte nur wenige Homologien mit Kleinhirnteilen der Placentalia aufstellen. Für Fissura parafloccularis und Fissura intrafloccularis gebraucht er die Bezeichnung von Fossa lateralis resp. paralateralis. Einen hervorstechenden Teil des Lobus Flocculi, welchen man, nach den Abbildungen zu urteilen, vielleicht mit dem Lobulus petrosus identifizieren könnte, nannte er fälschlicherweise Flocculus. Wie weit seine Vergleiche berechtigt sind, läßt sich schwer sagen. Auffallend ist bei den Marsupialier-Kleinhirnen die Regelmäßigkeit des Aufbaues und die Ähnlichkeit mit dem Kleinhirn der Placentalier.

In seiner Anatomie des Gehirns 1903 stellt Ziehen ebenfalls vergleichende Betrachtungen über das Kleinhirn an. Beim Pferde entscheidet er nicht sicher ob das dem Fastigium nasal benachbarte Lättchen der Lingula entspricht und glaubt auch nicht, daß eine Verteilung der nach vorn und oben darauf folgenden Lättchen auf Lobus centralis und Culmen sich mit genügender Wahrscheinlichkeit durchführen lasse. Die hinter dem Sulcus superior anterior gelegenen Lappen entsprechen wahrscheinlich dem Declive (Ba) und Tuber vermis (Bb). Ein Lättchen, welches als Folium vermis gedeutet werden könnte, hat Ziehen wiederholt gefunden. Pyramis (Bc), Uvula (Bd) und Nodus (Be) findet Z. sehr stark entwickelt. Die Vincula lingulae sind kaum zu erkennen, die Alae lobuli centralis und der Lobulus quadrangularis anterior (Lobulus paliformis) (Ia—b'), lassen sich nicht sicher trennen. Die hintersten Windungen des Declive und namentlich des Folium vermis gehen lateral meistens durch schmale Stiele in den gut erkennbaren Lobulus cruciformis (raupenförmigen Lappen) (Ic, c') über. Nach der Fig. 156 vom Pferde zählt Ziehen hier aber sicher auch einen

nur seitlich verlagerten Teil des Tuber vermis (Folium cacuminis?) mit in diesen Lappen. Die seitlich gelegenen Windungen der Hemisphären (II, III, IV) bezeichnet Ziehen als Tabulationen. — Beim Schafe findet Z. fast gleiche Verhältnisse wie beim Pferde, auch das Kleinhirn des Schweines bietet keine wesentlichen Abweichungen. — Am Carnivorenkleinhirn sind Declive und Tuber vermis (Ba und Bb) zu einem Lappen vereinigt. Das Folium vermis fehlt oft ganz; Pyramis (Bc), Uvula (Bd) und Nodus (Be) sind gut unterscheidbar. Die Trennung von Lobulus centralis (Ab) und Culmen (Ac, d) stößt oft auf Schwierigkeiten. — Die vordersten Windungen des Declive (Ba) lassen sich leicht auf die Hemisphären verfolgen. Die folgenden Windungen des Declive namentlich aber des Tuber vermis z. T. auch der Pyramis hören an dem Sulcus valliculae auf. Daneben bilden neue Windungen den Lobulus cruciformis. Er entspricht wohl vorwiegend dem Lobulus semilunaris inferior. Die seitlichen Hemisphärenwindungen nennt auch hier Ziehen Tabulata (Stockwerke).

Louis Bolk bringt in seiner Abhandlung „Hauptzüge der vergleichenden Anatomie des Cerebellum der Säugetiere mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Kleinhirns (Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie, Bd. 2, 1902) ganz neue Gesichtspunkte für die Einteilung des Säugetierkleinhirns. Er hebt das Bedenkliche der Übertragung der Namen des menschlichen Kleinhirns auf jenes der Tiere hervor und läßt daher die in der Human-Anatomie übliche Einteilung völlig außer acht. Er erkennt bei allen Säugetierkleinhirnen einen gleichen Bautypus. Von diesem hat sich das Kleinhirn des Menschen sehr weit entfernt. Es ist daher wenig geeignet, als Ausgangsform für weitere Vergleichen benußt zu werden. Der Verfasser erläutert hierauf, wie er sich den Bautypus denkt, unter Zugrunde-

legung des Cerebellum von Lemur albifrons. Er führt dann die wichtigsten Variationsrichtungen an und sucht schließlich die Frage zu beantworten: „Wie stellt sich das menschliche Cerebellum zu jenem der anderen Säugetiere und in welcher Richtung hat es sich besonders entwickelt.“

Das Kleinhirn besteht nach Bolk aus zwei Lappen — Lobus anterior und posterior — getrennt durch den Sulcus primarius Kuithan's. Diese beiden Lappen unterscheiden sich wesentlich dadurch, daß der erstere einfach, der letztere sehr verwickelt gebaut ist, außerdem hauptsächlich durch ihre Wachstumsart. Der aus quer gestellten Hirn- bzw. Markleisten gebildete Lobus anterior, welcher keine Hemisphärentteile besitzt (A a—d), hat nur ein Wachstumszentrum, das sich durch besonders starke Ausdehnung des medianen Lappenteiles in sagittaler Richtung äußert: Nach der Seite hin wird das Wachstum des Lobus anterior geringer, da keine Hemisphärenabschnitte nach Bolk am Lobus anterior existieren und sagittale Furchen fehlen, kann man auch nicht von einem Vermisteil reden.

Den Lobus posterior teilt Bolk in den vorderen kleineren Lobulus simplex und dem dahinter gelegenen, viel umfangreicheren Lobulus complicatus. Am Lob. simplex sind die Markleisten noch quer gestellt wie am Lobulus anterior. Der Lob. complicatus wird durch die Verlaufsänderung der Markleisten und durch das Auftreten der beiden Sulci paramediani charakterisiert, durch die er in einen Lobulus medianus posterior und zwei Lobuli laterales posteriores zerlegt wird. Diese drei Lobuli besitzen je ein Wachstumszentrum, die sich ebenfalls in sagittaler Richtung betätigen.

Der Lobulus posterior medianus (B a—e) entspricht dem Wurme älterer Autoren, dem Vermis inferior späterer. Er bildet ein Band von Lamellen, das hinter dem Lobulus simplex S-förmige Krümmung zeigt. Das Wachstumszentrum am Lobulus medianus hört in ge-

ringer Entfernung von der Medianebene plötzlich auf. So entstehen die Sulci paramediani und dadurch unterscheidet sich der Lob. poster. wesentlich vom Lobus anterior, welcher ja keine solche Furchen zeigt und dementsprechend auch keinen Wurmteil besitzt.

Als Grundprinzip im Bau der Lobuli laterales posteriores (I, II, III, IV) gilt, daß die Lappen zusammengefaßt sind aus kurzen Markleisten, die auf dem Markkern in einer typisch gefchlängelten Linie aufgesetzt sind. Man kann diese Linie verfolgen, wenn man die Mitte der einander anliegenden Markleisten successive verbindet. Man findet dann, daß diese Markleisten eine Kette bilden, die im Anschluß an den Lobulus simplex anfängt und an dem lateralsten Teil des Margo myelencephalicus cerebelli endet.

Schon die Seitenteile der Lamellen des Lob. simplex sind ein wenig nach vorne gerichtet. Dieser Verlauf geht bei dem ersten Markleistchen der lateralen Lamellenkette in einen rein sagittalen über. Das erste Stück der Kette verläuft von medial nach lateral, dann biegt die Kette plötzlich um und zieht medialwärts. Bolk nennt diese Schleife den Lobulus ansiformis (Ib—c). Die beiden Schenkel dieser Schleife heißen „Crus primum und secundum“ getrennt durch den „Sulcus intercruralis“, welcher bei *Lemur* wie auch den meisten Carnivoren rein quere Richtung hat. Er ist nicht gleichwertig mit den queren Furchen des Lobus anterior und Lob. simplex, welche primäre Furchen darstellen.

„Lobus paramedianus“ (Ic') ist der sich an das Crus secundum nach hinten anschließende Teil der ersten Windung. Er ist ein kleines Läppchen, welches dem Lob. median. post. parallel läuft. Den ganzen Rest des Lobulus lateralis posterior nennt Bolk *Formatio vermicularis* (II, III, IV). Dieselbe zerfällt in ein nach außen und vorne verlaufendes Crus circumcludens (II) (*Paraflocculus dorsalis sive Supra-*

flocculus), welches gleichsam als Rahmen um den Lobulus ansiformis zieht. Hierauf folgt die Pars floccularis (III) (Paraflocculus ventralis sive Mediflocculus), welche gefchlängelt ist, und der eine Schleife bildende Lobulus petrosus (IIIb), zuletzt der Uncus terminalis (IV) (Flocculus). Er besteht nur aus rudimentären Höckerchen. Der Lobulus petrosus bildet hingegen ein hervorragendes Appendix des Kleinhirns, welches wie ftielartig mit dem Markkerne verbunden ist.

Das Zustandekommen dieser Anordnung der hinteren Kleinhirnlappung erklärt Bolk wie folgt: Die drei Wachstumscentren des Lobus posterior erstrecken sich vom Vorderrande des Lobulus simplex bis zum Margo myelencephalicus. Vom mittleren Centrum findet nur geringe Ausdehnung in querer Richtung statt, weshalb der Lobul. median. posterior nur kurze Lamellen besitzt. Auch die seitlichen Wachstumscentren sind in querer Richtung nur wenig wirksam, in sagittaler hingegen wirksamer als das mediane. Je mehr dies der Fall, umso zahlreicher sind die Windungen, in welche die aus diesen Centren entstehenden Lamellenketten sich legen müssen. Zwischen den Lamellenketten bilden sich bei der Schlängelung natürlich sekundäre Furchen. Im Gebiete des Lobulus ansiformis ist die quere Wachstumsenergie größer und die Lamellen daher länger als im Gebiete des Lobulus paramedianus und der Formatio vermicularis.

Die Entstehung der Windungen der Lamellenkette des Lobulus lateralis posterior erklärt Bolk in folgender Weise: Wenn im vorderen Teile des Wachstumscentrums hinter dem Sulcus primarius höhere Tätigkeit eintritt, so findet hier in einem beschränkten Raume eine Anhäufung von Marklamellen statt. Diese werden anfänglich die hinten folgenden Lamellen nach hinten drängen; wird jedoch die Anzahl zu groß, so finden sie nicht genügenden Raum in einer geraden Linie; die Lamellenkette fängt daher an, sich in ihrem oberen Abschnitte nach außen zu biegen. In dieser Weise entsteht der Lobulus ansiformis. Daß die Oberflächenvergrößerung in sagittaler Richtung vor sich geht und nicht in querer, durch einfache Verlängerung der Markleisten, hängt vielleicht mit der Physiologie des Kleinhirns zusammen. Auch in den mehr seitlichen Teilen waltet das Wachstum in sagittaler Richtung vor. Durch Bildung von sekundären Schlingen kommt aber schließlich bei manchen Tieren ein Gewirre von Windungen zustande, in dem manchmal Lamellen von

den benachbarten überdeckt werden, so daß es schwer wird, die Kette zu verfolgen. Am deutlichsten sind meist das Anfangs- und Endstück der Schleife (*Crus circumcludens* (II) und *Uncus terminalis* (IV)) und es sind dieselben wohl als die primitiven Schenkel der Schleife aufzufassen. Die sie verbindende *Pars floccularis* (III) trägt durch die Bildung neuer Schlingen am meisten zur Komplizierung des Ganzen bei.

Im ganzen finden sich also vier Wachstumscentren in der Kleinhirnrinde: ein vorderes und drei hintere, wovon ein mediales und zwei laterale. Die Oberflächenausdehnung verläuft überwiegend in sagittaler Richtung, so daß der wirkliche Abstand zwischen *Margo mesencephalicus* und *myelencephalicus* ein enorm großer wird, wogegen der quere Durchmesser klein bleibt. Ursprünglich umfaßt jede Region, wenn auch noch nicht gesondert, zwei Seitenstücke und ein sie verbindendes Mittelstück. Erst später fangen diese einzelnen Stücke an, sich selbständig weiter zu entwickeln und da die Seitenstücke gewöhnlich eine intensivere Oberflächenausdehnung zeigen als das Mittelstück, so finden Verzerrungen statt. Wo die Sonderung von Mittel- und Seitenlappen nur gering ist, setzen sich noch mehrere Lamellen des *Lobulus medianus posterior* in solche der *Lob. laterales posteriores* fort. Bei den höher differenzierten Formen hingegen ist die regionale Zusammengehörigkeit einzelner Abschnitte des *Lobul. med. post.* und der seitlichen *Lobuli* nicht mehr zu sehen. Die *Sulci paramediani* bilden eine tiefe trennende Kluft. Bolk ist der Ansicht, daß man im *Lob. med. poster.* drei Regionen unterscheiden kann: eine obere, mittlere und untere, von denen je eine entspricht einer der drei Hauptregionen des *Lobulus lat. poster.*, nämlich dem *Lobul. anisiformis*, *Lobul. paramedianus* und der *Formatio vermicularis*.

Als Grundursache der Windungen der Lamellenketten sind histogenetische Umänderungen in der Rinde anzusehen, welche eine Ausdehnung der letzteren herbeiführen und grobmechanisch zweierlei Erscheinungen erzeugen können. Bei Schmalbleiben der einzelnen Lamellen biegen sich die Lamellenketten seitlich aus. Dieser Vorgang ist bei starker Breitenentwicklung der Lamellen nicht möglich. Es tritt hier vielmehr eine Biegung der Ketten in sagittaler und vertikaler Richtung ein.

Zwischen *Cerebrum* und *Cerebellum* bestehen nach Bolk grundsätzliche Unterschiede im Wachstum. Beim *Cerebellum* findet Ausdehnung der Rinde wesentlich in sagittaler Richtung statt. Beim *Cerebrum* sind eine größere Anzahl von Centren vorhanden, deren

gegenseitige Konkurrenz einen anders gearteten Faltentypus der Rinde hervorruft.

Die Unterschiede in der Gestaltung der Kleinhirnoberfläche bei den verschiedenen Säugetieren sind hauptsächlich bedingt durch den Entfaltungsgrad der Lamellenkette am Lobus posterior.

Der Lobus anter. tritt fast bei allen Formen als eine Gruppe quergestellter Randwülste auf, welche im allgemeinen bei größeren Tieren zahlreicher sind.

Die Formunterschiede des Lobus posterior bestehen in Vereinfachung oder Komplizierung der Lamellenketten der verschiedenen Lobi. Am Lobulus medianus können an zwei Stellen Krümmungen im Kettenverlaufe auftreten, meistens unmittelbar hinter dem Lobulus simplex. Bei Bos und Equus bilden sie einen zusammengesetzten Knäuel, welcher viel zu dem blumenkohlähnlichen Aussehen des Kleinhirns dieser Tiere beiträgt (Bb). Einfachere Krümmungen sind hier bei den meisten Carnivoren vorhanden. Sie fehlen hingegen bei Ursus arctos und Mustela. Bei Cervus, Ovis, Sus und Phocaena findet sich nur eine einfache S-förmige Krümmung. — An dem Nachhirnende des Lobulus median. poster. scheinen nur selten Krümmungen aufzutreten (Phoca).

Die Lamellenkette des Lobul. lateral. post. zeigt Komplikationen in dem Auftreten von sekundären Krümmungen oder accessorischen Schleifen, welche am häufigsten in der Pars floccularis (III) der Formatio vermicularis vorkommen. Doch auch im Gebiete des Crus circumcludens (II) kommen sekundäre Schleifen vor (u. a. bei Bos taurus). Vereinfachungen im Verlaufe der Lamellenkette des Lobul. lat. post. zeigen sich meist am Lobulus ansiformis. (Kaninchen, Ratte, andere Beispiele s. Bolk S. 456.)

Zwischen dem Entwicklungsgrade des Mittelstückes und jenem der Seitenstücke bestehen gewisse, aber nicht konstante Beziehungen: Der Lobus paramedianus und der entsprechende Teil des Lob. med. post zeigen niemals Krümmungen. Hingegen variiert mit dem Lobul. ansiformis das entsprechende Mittelstück am meisten, aber auch nicht immer. Bei Bos und Equus z. B. ist das obere Stück des Lob. median. poster. stark gefaltet, der Lobul. ansiformis nur wenig entwickelt. Auch das dritte Stück des Lobul. median. post. ist fast immer einfach gebaut, obgleich die genetisch dazu gehörige Formatio vermicularis sehr wechselnd entwickelt ist.

In Bezug auf das menschliche Kleinhirn macht Bolk auf die fehlerhafte Bezeichnung Vermis aufmerksam, welche oben schon mitgeteilt wurde. — Die Bedeutung, welche dem Sulcus horizontalis

cerebelli beigelegt wird, ist vom topographischen und deskriptiven Standpunkt zu rechtfertigen, nicht aber vom genetischen. Er entsteht nicht wie alle andern Primärfurchen in der Medianlinie zuerst; er ist vielmehr lateral am tiefsten und erreicht die Medianlinie meistens nicht. Vergleichend-anatomisch entspricht er der Fossa lateralis des Makikleinhirnes. Seine Wände sind der zusammengeknickte Seitenrand des Kleinhirns. Der Sulc. horizontalis ist bei dem Affen der alten Welt schon weniger entwickelt und kommt unter den Neuweltaffen nur bei den größeren Formen vor. Bei allen anderen Tierformen kommt er nur als Fossa lateralis vor.

Die charakteristische Anordnung der Lamellen in Ketten glaubt Bolk auch beim Menschen zu finden — wie wohl hier — und das ist auch bei allen Affen der Fall — eine übermäßige Entfaltung eines der Unterteile und rudimentäre Entwicklung anderer einen scheinbar neuen, den übrigen Tierformen nicht verwandten Typus vortäuschen. Das Charakteristische des menschlichen Kleinhirns gegenüber dem Kleinhirn der übrigen Säugetiere faßt Bolk in folgenden Worten zusammen: „Das menschliche Kleinhirn kennzeichnet sich durch die — ich möchte fast sagen — monströse Entwicklung des Crus primum des Lobulus ansiformis und eine weitgehende Reduktion der Formatio vermicularis.“ Am Schluß der Arbeit ist eine übersichtliche Darstellung seiner Einteilung des Kleinhirns mit Beifügung der sonst üblichen Bezeichnungen. Ich lasse dieselben folgen:

Lobus anterior =	{	Lingula	
	{	Lobulus centralis. (Alae	
	{	Lobuli lunati anterioris)	
Lobus posterior =	{	Lobulus simplex (= Lobuli	{ Lobulus medianus
	{	lunati posteriores u. Declive)	posterior =
	{	Lobulus complicatus	Vermis inferior (Fo-
			lium cacuminis, Tu-
			ber valvulae, Pyra-
			mis, Uvula, Nodulus)
			Lobuli laterales
			posteriores
			Crus primum =
			(Lobulus semilunaris
			superior
			+ Lobulus semiluna-
			ris inferior
			+ Lobulus gracilis)
			Crus secundum =
			Lobul. cuneatus.
Lobuli laterales	{	Lobulus ansiformis	
	{	Lobulus paramedianus	
posteriores	{	Tonsille	
	{	Formatio vermicularis	
	{	(Paraflocculus+Flocculus)	

Dexler (Zur Kenntniss des feineren Baues des Zentralnervensystems der Ungulaten) ist von den Ergebnissen Bolks und der früheren Kleinhirnforscher nicht genügend befriedigt. Er hält ein Durchschnittsschema für angezeigt, welches die genetischen und morphologischen Gesichtspunkte möglichst berücksichtigt. Endgiltigen Aufschluß erwartet er erst von vergleichenden entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen.

Nach Dexler teilt beim Pferde der Sulc. cerebell. sup. ant. = Sulc. primarius Kuithans den Wurm in Vorder- (Aa-d) und Hinterwurm (Ba-e). Jener wird gebildet von: der ventralen Lingula (Aa), dem ventronasalen Lobus centralis (Ab), dem dorsonasalen Lobus ascendens (Ac) und dem dorsalen Culmen monticuli (Ad), einschließlich Lobus lunatus anterior. Der Hinterlappen wird gebildet von dem dorsalen Tuber vermis (Ba, b) (= Declive und eigentlichem Tuber vermis, die am Tierhirn als zusammenhängend zu betrachten sind), der Pyramis (Bc), Uvula (Bd) und dem Nodulus (Be).

Vom centralen Markkerne des Kleinhirns gehen verschieden dicke Strahlen ins Innere der Wurmlappen; die stärksten gehen vor und hinter der tiefen Furche zwischen Culmen und Tuber vermis ab. Der orale teilt sich oft in zwei Äste und geht zum Culmen. Die ventrooral davon abzweigenden werden allmählich kleiner und gehen zum Lobus ascendens und centralis; der letzte zur Lingula. Diese verhält sich beim Pferde sehr verschieden. Der caudal von der tiefen Dorsalfurche liegende Markast geht zunächst horizontal und biegt dann dorsal um, sich erst peripher in zwei Nebenäste teilend, wovon der vordere in das Declive, der hintere in das eigentliche Tuber vermis führt; in caudoventraler Richtung folgen dann noch weitere drei Markstrahlen für Pyramis, Uvula und Nodulus.

Der ventrale Teil des Lobulus centralis ist schmal, der dorsale durch die Alae lobuli centralis verbreitert. Lo-

bus ascendens und Culmen sind meist je zweiteilig. Eine exakte Abgrenzung zwischen Lob. central, L. ascend. und Culmen ist nicht bekannt. Die Markstrahlen sind sehr variabel verteilt, auch kann durch Variation der Tiefe der Trennungsfurchen und stärkere Ausbildung der Seitenanhänge eine Verschiebung der Lappenzahl eintreten. Durch starke Ausbildung des Declive (Ba) entsteht ein langes Kleinhirn. Außer am Dorfteil des Lob. centralis besitzen auch Lobus ascendens, Culmen und Declive flügelartige Anhänge, Alae (Ia, b). — Tuber vermis hat drei unsymmetrisch gelagerte Läppchen, so daß der Wurm auf Mediansehnitten hier eine Unterbrechung zeigt. Manchmal ist in der Tiefe zwischen Declive und Tuber vermis ein Folium vermis vorhanden. — Pyramis hat keine Seitenflügel. Häufig aber ist sie durch eine rindenlose Marklamelle mit einem zur Flocke reichenden Läppchen verbunden. — Die Uvula ist lang und weist gewöhnlich zwei Unterlappen auf. Zweimal fand D. einen rindenlosen Markkern zur Flocke ziehen.

Zum medialen Hemisphärenteile rechnet Dexler nach Flatau und Jakobson den Lobus quadrangularis (Ib, b'), Lobulus semilunaris superior (Ic) und Lobulus semilunaris inferior (Ic'), von denen der Lob. quadrangularis in den Lob. lunat. ant. (Ib) und poster. (Ib') zerfällt.

Der Lob. lunat. anter. geht durch einige Windungskämme in das Declive (Ba) über. Der Lobus lunat. post. hängt ebenfalls damit zusammen, aber durch ein schmaleres Verbindungsstück. Dem Lob. quadrangularis (Lobulus palpiformis Ziehen) hängen die beiden Lobi semilunares wie ein schlangenartig gewundener Schwanz an. Mit Ziehen will sie Dexler als Lobulus eruciformis (raupenförmiger Lappen) zusammenfassen.

Der laterale Hemisphärenteil (II, III, IV) besteht aus zwei sagittal stehenden Scheiben kleinster Läpp-

chen, welche einem lateralen und medialen Teile des Lobus eruciformis entsprechen. Ein kleines Läppchen am caudo-ventralen Ende der medialen Scheibe ist vielleicht der Lobulus biventer (I c').

Das Furchenschema ist nach Dexler am Equidenkleinhirn noch viel ungenauer zu differenzieren, als das feiner Windungen.

Von den Längsfurchen ist die auffallendste die Fissura paramediana. Zwischen medialer und lateraler Hemisphärenregion liegt die Fissura sagittalis profunda (Sulcus arcuatus superior Ziehen's). Zwischen lateraler und medialer Scheibe des Lobus cuneatus liegt die Fissura sagittalis superficialis. — Von den Querfurchen können eigentlich nur die des Wurmes im Sinne einer Homologie discutiert werden.

Dexler unterscheidet einen Sulcus praeuvularis, dann zwischen Uvula und Pyramis den S. inferior anterior, zwischen letzterer und Tuber vermis den S. inferior posterior. — Sulcus horizontalis und S. superior posterior fallen bei der Inkonstanz des Folium vermis zusammen. Die Furche ist ziemlich tief und hängt mit einer Furche zusammen, welche den Lob. quadrangularis quer teilt.

Zwischen Declive und Culmen folgt der Sulcus superior anterior, welcher sich seitlich durch die Fissura paramediana fortsetzt, den Lobus lunatus scharf von den Flügeln des Culmen scheidet und in der Fissura sagittalis profunda endet. (Flatau-Jakobson lassen diese Furche den Isthmus zwischen Declive und Lobulus lunat. anterior übersteigend nach der Querteilungsfurche des Lobus quadrangularis gelangen, was Dexler nicht zugibt.)

Ellenberger und Baum folgen in ihrer neuesten Darstellung den Ausführungen Dexlers. Sie haben diejenigen Bezeichnungen für die einzelnen Kleinhirnlappen eingesetzt, deren Homologie nach ihrer Meinung entweder ganz sichergestellt oder über deren Identität wenigstens

die Mehrzahl der Morphologen zu einem einheitlichen Urteil gelangt ist. Sie führen in einer Anmerkung auch die von mir f. Zt. vorgeschlagene Einteilung des Kleinhirns der Haustiere an (f. S. 34—39), welche von einer speziellen Homologisierung der Lappen abieht, begehen dabei aber die kleine Unrichtigkeit, die sagittalen Seitenwülste, welche ich als *Lobi laterales* bezeichnet habe, *Lobuli* zu nennen. Außerdem sprechen sie von schlangenartig verlaufenden Sagittalfurchen, während ich einen schlangenförmigen Verlauf der Windungszüge erwähne, was genau betrachtet doch etwas wesentlich anderes ist.

Die Bezeichnungen der Hemisphärenteile des Kleinhirns, welche Ellenberger-Baum in ihrer Anatomie des Hundes und ihrem Handbuche der Anatomie der Hausfäuger gebrauchen, haben mit der Zeit gewechselt.

Der einschneidende Unterschied ist hiebei, daß die Bezeichnungen *Lobulus semilunaris* und *cuneiformis* in der XII. Auflage gegen jene der Hundeanatomie umgetauft wurden.

Martin berichtet in den bisher nicht veröffentlichten Vorschlägen zur Bereinigung der veterinäranatomischen Nomenklatur 1899, bei der er das Referat über das Zentralnervensystem hatte, das in Kleindruck unten folgende. Der Wunsch einer genaueren Nachprüfung des dort Gefagten und der bisherigen Veröffentlichungen anderer Forscher gab die Veranlassung, daß Prof. Martin mich mit den vorliegenden Untersuchungen betraute.

Die Gestaltung des *Cerebellum* unserer Haussäuger erforderte bei der, namentlich am *Hemisphärium cerebelli* so grossen Verschiedenheit gegenüber dem menschlichen Kleinhirn eine von den B. N. A. wesentlich abweichende Einteilung und Benennung. Unerlässlich ist allerdings zur genauen Einsicht einmal die gründliche Entfernung aller Gefäße und lockeren Hirnhautteile, sowie die Anlegung eines Median-schnittes durch den Wurm.

Außerlich sind die einzelnen Abteilungen des *Vermis cerebelli* nur bei genauerer Betrachtung unterscheidbar. Immerhin fällt

nasoveutral der Lobus nasoveutralis (centralis hominis) mit seinen kreuzarmartig hinausstehenden Alae auf. Ebenso regelmäßig kommt am Caudalteile des Wurms eine seitliche Schlängelung vor. Die Längenausdehnung, Stärke der Ausbiegungen, wie auch die Unterbrechungen dieser Schlangenwindungen sind nicht nur nach der Tierart, sondern auch individuell sehr verschieden. Ich habe daher von einer Benutzung derselben für die äußere Einteilung des Wurms abgesehen. Ihre Entstehung wird, wie die der Kleinhirnlappung, überhaupt entwicklungsgeschichtlich noch genauer zu untersuchen sein. Mehr Aufschluß gibt ein Vergleich der Oberflächengestaltung des Wurmes mit dem Bilde des Medianschnittes.

Es ist hier nicht zu verkennen, daß der Arbor medullaris (Arbor vitae) nach der Verteilung seiner Hauptstämme in einen nasalen und einen caudalen Abschnitt zerfällt, welch beide der Pars nasalis (Aa--d) und Pars caudalis vermis (Ba--e) entsprechen. Die Lobi und Lobuli dieser Hauptabschnitte des Wurmes werden entweder von einzelnen größeren oder mehreren kleineren Zweigen des Arbor medullaris versorgt. Individuelle Verschiedenheiten sind bei diesen Ast- und Zweigbildungen sehr häufig. Kleinere Zweige erhalten die ventralen Lappen, größere Äste die dorsalen. Doch kommt es vor, daß bei einem Tiere zwei Äste vorhanden sind, wo bei einem andern Tier derselben Art ein einziger größerer Stamm vorhanden ist.

Im allgemeinen stimmen die in der Liste aufgeführten Lobi und Lobuli mit den dahinter eingereihten Teilen des Menschengehirns überein; indessen kommen mannigfache individuelle Abweichungen in bezug auf Lage und Tiefe der Einschnitte zwischen den Lappen und Läppchen vor. Dies, sowie die verschiedene Gestaltung der Lobuli gegenüber denen des Menschen, z. T. auch der Haussäugerarten unter sich haben mich veranlaßt Namen mehr indifferenten Natur zu wählen. Jedenfalls ist die rein topographische Bezeichnung der Lobi und die Zahlenbezeichnung der Lobuli den für die Haussäuger nur schwer anzupassenden Namen der B. N. A. vorzuziehen.

Lobi hemisphärii cerebelli. Die Homologisierung der Hemisphärenlappen der Haussäuger mit denen des Menschen war mir durchaus unmöglich. Ich fand vielmehr, wie das Sußdorf schon andeutet, durch im wesentlichen sagittal verlaufende Furchen ebenso gestellte Wülste abgeteilt und bei näherer Betrachtung ergab sich, daß diese in viele kleine Windungen zerspaltenen Höhenzüge in ihrer Gesamtheit eine Schlangenlinie darstellen. Die einzelnen Wülste, Abschnitte der Schlangenlinie, nannte ich Lobi.

Der erste Wulst, Lobus lateralis primus (Ia—c) liegt neben dem Wurm. Er beginnt nasal mit einem breiten Teil, der durch mehrere Windungen mit dem Wurm in Verbindung steht. Besonders breit ist dieser Anfangsteil beim Schwein und beim Hunde (bezw. Fleischfresser), weniger breit beim Wiederkäuer und am schmalsten beim Pferd. Mit der Breite desselben hängt die Form der übrigen Teile des Lobus lateralis primus zusammen, indem der anschließende Abschnitt bei denjenigen Tieren, welche einen sehr breiten Anfangsteil haben, in querer Richtung vom Lateralende des Anfangsteiles zum Wurm hinläuft, um dort angekommen caudoventrale Richtung einzuschlagen. Es entsteht in der Mitte des Lobus lateralis ein Bogen nach der Seite hin, Arcus (Ib und c), dessen beide Schenkel durch den Sulcus transversus von einander getrennt werden. Beim Wiederkäuer ist dieser Bogen nur schwach entwickelt, beim Pferde nur angedeutet. Den nasal vom Sulcus transversus gelegenen, breiten Anfangsteil habe ich Pars nasalis lobi lateralis primi genannt; (er bildet also auch den Nasalschenkel des Bogens). Den Caudalschenkel des Bogens müßte man dementsprechend als Pars caudalis sagittalis (Lobi lateralis primi) bezeichnen.

Auf den Lobus lateralis primus folgen seitlich mehr oder weniger regelmäßig angeordnet die übrigen Sagittalwülste, Lobus lateralis

Neuer Vorschlag Martins	Bolk	Bradley	Dexler	Ellenberger Baum
A. + B. Tractus medianus cerebelli			Vermis	Vermis
A. Lobus medianus nasalis	Lobus medianus anterior		Lobus anterior (n. Bolk) Vorderwurm	Vorderwurm
Aa—c Lobuli nasoveventrales				
Aa (Lingula)	Lingula	Teild Lob. centralis	Lingula	Lingula
Ab (Lobulus centralis)	Lobulus centralis	Lobulus centralis	Lobulus (Lobus) centralis	Lobus centralis
Ac—d Lobulus nasodorsalis				

secundus (II, tertius (III), quartus (IV) und beim Pferd ¹⁾, auch noch quintus (IV). Beim Schwein und Fleischfresser ist auch, der Verlauf dieser Wülste weniger rein sagittal als beim Wiederkäuer und Pferd; namentlich der Lobus lateralis secundus paßt sich der Bogenform des Lobus primus an. Aus diesem Grunde habe ich den Namen Seitenlappen, Lobus lateralis, der Bezeichnung der Sagittalwülste vorgezogen, welche ja für Pferd und Wiederkäuer zu treffend wäre. — Beim Schwein ist der zweite und dritte Seitenlappen durch ein kleines Anhängsel in der Mitte ausgezeichnet, welches die Übersicht über den Verlauf der Schlangenlinie etwas stört. Ist man aber einmal darauf aufmerksam geworden, daß die Linie hier nur verdeckt ist, so wird man sie stets wieder leicht ausfindig machen. Ob man diesem Appendix einen offiziellen Namen geben soll, lasse ich dahingestellt.

Meine Untersuchungen haben ergeben, daß der Grundsatz, nach welchem die eben angeführten Namen aufgestellt sind, richtig ist. In einigen Einzelheiten habe ich jedoch auf Anregung von Prof. Martin Änderungen getroffen, f. untenstehende Tabelle.

¹⁾ Hier wurde fälschlicherweise der 2. Teil des Lob. lat. tertius als L. l. quartus bezeichnet.

Flatau Jakob- sohn	Künne- mann	Kuithan	Martin früh. Be- nennung	Smith	Stroud	Ziehen
Vermis			Vermis		Vermis	Vermis
Vorder- wurm	Lobus superior	Vorder- lappen	Lobus na- salis	Lobus anti- cus	Preramus	
			Lobulus nasoven- tralis	} Lobus anterior		
Lingula		Lingula	Lingula	Pars lingualis	Lingula	Lingula ?
Lobus centralis		Lobulus centralis	Lobus centralis	Pars prae- culmi- nata	Lobus ce- phalicus?	Lobus centralis
			Lobulus nasodor- salis			

Neuer Vorschlag Martins	Bolk	Bradley	Dexler	Ellenberger Baum
A c (Lobulus ascendens monticuli)		Lobus culminis	Lobus ascendens	Lobus ascendens
A d (Culmen monticuli)		Lobus culminis	Culmen monticuli	Culmen monticuli
B. Lobus medianus caudalis	Lobus posterior (Besteht aus dem vorderen Lobulus simplex (Ba) und dem Lobulus complicatus.) Letzterer zerfällt in den Lobulus poster. medianus oder Vermis (Bb bise) und die beiden Lob. post. lateral. (I, II, III, IV)			
Ba—b Lobulus caudo-dorsalis				
Ba (Declive)		Clivus monticuli	Declive	Declive
Bb (Tuber vermis)		Tubervalvulae + Folium cacuminis	Tuber vermis	Tuber vermis
Bc Lobulus caudalis		Pyramis	Pyramis	Pyramis
Bc (Pyramis)				
Bd Lobulus caudo-ventralis				
(Uvula)		Uvula	Uvula	Uvula
Be Lobulus ventralis				
(Nodulus)		Nodulus	Nodulus	Nodulus
Tractus lateralis primus				
Pars nasalis tr. lat. I (Ia, a')		Lob. lunat. ant.	Alae lobuli centr. ascendentis et Culminis	

Flatau Jakob- sohn	Künne- mann	Kuithan	Martin früh. Be- nennung	Smith	Stroud	Ziehen
Lobus as- cendens		Culmen monticuli	Pars as- cendens monticuli	Pars culmi- nata	Lobus centralis	Culmen
Culmen		Culmen monticuli	Culmen monticuli	Pars culmi- nata	Culmen	
	Lobus posterior		Lobulus caudo- dorsalis		Postra- mus Prepi- leum	
Declive Pars ant. tub.verm.	Lobus primus	Declive monticuli	Declive monticuli	Pars supra- pyra- midal.	Clivus Cacumen	Declive
Pars post. tub.verm.	Lobus secundus	Tuber valvulae	Folium u. Tuber vermis		Tuber	Tuber vermis
Pyramis	Lobus tertius	Pyramis	Pyra- mis	Pyra- mis		Pyramis
			Lobulus caudoventralis			
Uvula	Lobus quartus	Uvula		Lobus posticus	Post- pileum	Uvula
Nodulus		Nodulus	No- dulus	Nodu- lus	"	Nodulus
			Lobus lateralis primus		Pilea	
Teile des Lobul. quadran- gularis		Alae lo- buli cen- tralis u. Lob.lunat. anter.			Prepi- leum	

Neuer Vorschlag Martins	Bolk	Bradley	Dexler	Ellenberger Baum
Pars caudalis tract. lat. I (Ib, c'')	Lobul. an- siformis (Crus pri- mum des- selben)		Lobulus quadrang- ularis	
Anfangsteil (Ib, b')				
Ib		Lob. lu- nat. post.	Lobulus lunatus anter.	Lobulus lunatus nasalis
Ib'		Lobul. postero- superior	Lobulus lunatus posterior	Lobulus lunatus caudalis
Pars caudalis tract. lat. I	Teil des Lobul. an- siform. u. Lobul. parame- dianus			
Endteil (Ic, c'')				
Ic	Crus se- cundum d. Lobul. ansiform.	Lobul. semilu- nar. infer.	Lobulus semiluna- ris super.	Lobulus semiluna- ris dor- salis
Ic'	Lobul. parame- dianus	Lobulus gracilis ant. und poster.	Lobulus semiluna- ris infe- rior	Lobulus semiluna- ris ven- tralis
Ic''	Lobul. parame- dianus	Lobus biven- tralis	Lobulus biventer?	Lobulus biventer
Tractus lateralis secundus (II a, b, c)	Crus cir- cum- cludens formatio- nis verm- icularis	Parafloc- culus dor- salis	Lobulus cuneifor- mis	Lobulus cuneifor- mis (frü- her semi- lunaris superior)
Tractus lateralis tertius (III a, b, c)	Pars floc- cularis u. Lobul. petros. formatio- nis verm.	Parafloc- culus ven- tralis	Lobulus cuneifor- mis	Lobulus cuneifor- mis (frü- her semi- lunaris in- ferior)
Tractus lateralis quartus (IV)	Uncus terminalis	Flocculus	Flocke oder Ton- sille	Flocculus

Flatau- Jakob- sohn	Künne- mann	Kuithan	Martin früh. Be- nennung	Smith	Stroud	Ziehen
	Teil des Lobus primus				Prepi- leum	Lobulus- quadran- gularis anterior u. poste- rior (Lo- bulus palpifor- mis)
Teile des Lobul. quadrang.		Lobus lu- natus posterior		Area lunata	"	
				Area pteroidea	"	
				Paraver- mis		
Lobul. se- mil. sup.	Lobus recur- vatus	Lobus se- milunaris superior		Area post- pteroidea	Postpi- leum	Lobulus erucifor- mis
} Lobul. semil. inf.	Lobus tertius la- teralis	Lobus se- milunaris inferior		Area parapyra- midalis		"
				Copula pyrami- dis	Post- pileum	"
Lobul. cuneifor- mis	Lobus tertius externus	Lobus cuneifor- mis	Lobus la- teralis secundus	Parafloc- culus dor- salis	Parafloc- culus	Tabulata
Tonsille	Lobus tertius externus (s. oben)	Lobus cuneifor- mis	Lobus lateralis tertius	Parafloc- culus ven- tralis	Parafloc- culus	"
Flocculus	Lobus flocculus	Tonsille	Lob. late- ral. quart. (et quint)	Flocculus	Flocculus	"

Eigene Untersuchungen.

Bevor ich nun dazu übergehe eine Einteilung aufzustellen, wie ich sie für die übersichtlichste und zweckmäßigste halte, will ich zunächst meine Befunde bei der Untersuchung des embryologischen Materials anführen, welches mir zur Verfügung stand.

Es sind schon von verschiedenen Forschern embryonale Kleinhirne einiger Hausfäuger untersucht und beschrieben worden (f. Bradley S. 10 und Kuithan S. 14); es handelt sich daher hier wesentlich darum, Lücken auszufüllen und einige Fehler zu berichtigen. Die Kleinhirne der Rinder-, Schaf- und Schweineembryonen habe ich mit Hilfe einer Lupe oder mit unbewaffnetem Auge untersucht. Von den Köpfen der Katzenembryonen wurden sagittale Serienschritte angefertigt und mit dem Mikroskop untersucht.

Rinderembryonen.

Die Gestalt des Kleinhirns zu Beginn der Furchenbildung.

Das Kleinhirn hat um diese Zeit ungefähr die Gestalt einer nach unten konkaven Sichel. Die Seitenteile sind außerdem nach vorne gezogen. Man kann eine Vorderfläche, eine obere hintere, eine untere und auch schon zwei seitliche Flächen unterscheiden. Die Vorderfläche zeigt eine mediane Hervorwölbung. Die untere Fläche kommt für die Furchenbildung nicht in Betracht. Das Kleinhirn entrollt sich im Laufe der Entwicklung sozusagen über seine Querachse in caudaler und ventraler Richtung, indem sich die ventrale Fläche in sagittaler Richtung nicht entsprechend mit den übrigen Flächen ausdehnt. Sie bildet vielmehr beim ausgewachsenen Kleinhirn einen Querspalt an der Decke der Rautenhirnkammer. Durch dieses Entrollen des Kleinhirns nähert sich der untere Rand der Vorderfläche jenem der oberen hinteren Fläche und berührt ihn schließlich. Nach unten liegen dann Teile, die anfangs nasal bzw. caudodorsal gelegen

waren. Die Vorderfläche geht dann in die obere hintere Fläche in scharfem Bogen über. Letztere zeigt eine mediane, flache muldenförmige Vertiefung, die am hintern Rande am tiefsten ist und beim Beginn der Furchenbildung wieder verschwindet. Der Kürze halber will ich die beiden Ränder der vorderen und der oberen hinteren Fläche „vorderen“ resp. „hinteren Rand“ nennen und in gleichem Sinne die Bezeichnungen „vor“ und „hinter“ gebrauchen. Für die Furchen und Kleinhirnteile wende ich vorerst der Kürze halber Zahlen und Buchstaben an.

No. I. Kleinhirn 6 mm breit, 2 mm lang (in der Medianebene gemessen) und 2 mm hoch (ebenso gemessen). Die Gestalt habe ich bereits beschrieben, sodaß ich gleich zur Furchenbildung übergehen kann.

Im oberen Teile der Vorderfläche ist eine Furche, die ungefähr über ein Drittel der Kleinhirnbreite reicht. Sie ist in der Mitte am tiefsten und flacht sich nach beiden Seiten hin allmählich ab. Ich will sie mit I (Fissura prima) bezeichnen. Der vor ihr gelegene Teil des Kleinhirns heiße A (Aa—d)¹⁾. Vor dem hinteren Rande ist eine zweite Furche, die median sehr nahe an dem hintern Rande gelegen ist und sich seitlich etwas weiter von demselben entfernt. Sie geht auf die Seitenflächen über und scheint den vorderen Rand derselben zu erreichen. An der Stelle, wo sie auf die Seitenflächen umbiegt, ist sie nur mit Mühe zu verfolgen. Seitlich wird sie wieder deutlicher. Es ist daher nicht unmöglich, daß sie aus einem mittleren und zwei seitlichen Teilen entstanden ist. Diese Furche sei mit II bezeichnet²⁾. Der hinter ihr gelegene mittlere Teil des Kleinhirns heiße B (Be), die beiden seitlichen Teile K (IV).

No. II. Embryo 7½ cm, Kleinhirn 8 mm breit, 2 mm lang, 3 mm hoch.

An der Vorderfläche des Kleinhirns vor I sind in ungefähr gleichen Abständen vier gut entwickelte Furchen erschienen, die den seitlichen Rand der Vorderfläche des Kleinhirns nicht erreichen. Sie zu benennen halte ich für überflüssig.

Furche II²⁾ ist deutlicher geworden. Ungefähr in der Mitte der oberen hinteren Fläche sind drei neue, einander sehr nahe gelegene

¹⁾ Ich setze die bisher gebräuchlichsten Bezeichnungen der entsprechenden Teile am ausgebildeten Kleinhirn oder die Zahlen und Zeichen der Schemata (Fig. 7—17) zur Orientierung in Klammer oder Anmerkung neben die für die embryologische Besprechung zweckmäßig anders lautenden, welche auf Fig. 5 u. 6 angegeben sind.

²⁾ Sulc. praeuvularis s. postnodularis aut.

kurze Furchen erschienen, von denen die vorderste am deutlichsten ist und sich am weitesten seitlich ausdehnt. Sie seien von hinten nach vorne III¹⁾, IV²⁾ und V, und die hinter ihnen liegenden Teile C (Bd) D (Bc) und E (Bb)³⁾ genannt. An den seitlichen Teilen des Kleinhirns ist jederseits eine kurze quere Furchen bemerkbar. Es sind dies die Seitenteile von V, wie sich aus der weiteren Entwicklung ergibt. Die Furchen V entsteht demnach aus einem mittleren und zwei seitlichen Teilen.

No. III. Embryo 8 cm lang, Kleinhirn 8 mm breit, 3 mm lang, 3¹/₂ mm hoch.

Dieses Kleinhirn besitzt vor Furchen I fünf Furchen, deren Länge nach vorne zu abnimmt. Anstatt der bisherigen oberen hinteren Fläche kann man jetzt von einer oberen und einer hinteren Fläche sprechen. Furchen II ist an der Stelle, wo sie auf die Seitenfläche umbiegt, etwas nach oben und vorn gezogen. Hier geht von ihr eine muldenförmige Vertiefung aus, die sich eine kurze Strecke weit nach vorne erstreckt. Sie heiße a. In dem vorderen Teile derselben mündet von seitwärts eine kurze quere Furchen ein, die ich X⁴⁾ nennen will. Auf der linken Seite geht sie medial über a hinaus. Auf der rechten Seite hat sie eben erst a erreicht. Lateral endet sie, bevor sie den Seitenrand des Kleinhirns erreicht hat. Der Teil des Kleinhirns, der durch II, a und x begrenzt wird, heiße L⁵⁾. a bildet also die Medialgrenze von L. Unter der Furchen II verläuft eine Furchen, die sich der Furchen II, dort wo dieselbe auf die Seitenflächen umbiegt, nähert. Diese Furchen sei mit y bezeichnet. Lateral begrenzt sie den Kleinhirnteil K⁶⁾ nach unten gegen die Brücke. (Über II ist jederseits eine Furchen, die im mittleren Teile mit II verschmolzen ist. Ihre Enden trennen sich spitzwinklig von II. Sie reicht bis zum vorderen Rande der Seitenfläche. Medial reicht sie nicht über a hinaus. Diese Furchen möge z heißen. Sie scheint im Laufe der Entwicklung wieder zu verschwinden.) An der oberen Fläche sind drei Furchen bemerkbar, nämlich III, IV und V. III¹⁾ und IV²⁾ liegen sehr nahe aneinander und scheinen nur über das mittlere Drittel der Oberfläche zu reichen. V. verläuft über das ganze Kleinhirn. Die drei Teile von V haben sich bei diesem Embryo bereits vereinigt und bilden nun eine zu-

¹⁾ Sulcus nasoventralis, s. Fissura secunda aut. ²⁾ Sulcus caudoventralis, s. Fiss. suprapyramidalis aut. ³⁾ Uvula, Pyramis, Tuber vermis aut.

⁴⁾ Sulcus arcuatus seu Fissura sagittalis profunda, Fiss. parafoccularis. ⁵⁾ Fig. 11—17, II u. III; Parafocculus, Lobus cuneiformis aut.

⁶⁾ Fig. 11—17, IV; Flocculus.

sammenhängende Furche. Kurz hinter dem vorderen Rande der oberen Fläche, also vor V, ist eine sehr kurze Furche. Die Vorderfläche zeigt über I ebenfalls eine Furche, die etwa das mittlere Drittel der Kleinhirnbreite kreuzt. Diese beiden Furchen seien mit VI¹⁾ und VII bezeichnet; die drei Teile, in welche durch diese beiden Furchen der zwischen V und I gelegene Teil des Kleinhirns geschieden wird, heißen F²⁾, G und H³⁾.

No. IV. Embryo 8½ cm lang, Kleinhirn 7 mm breit, 2 mm lang, 2½ mm hoch.

Vor II sind vier Furchen, z ist beiderseits vorhanden. Daß die beim vorigen Kleinhirn sich spitzwinklig von II trennenden Stücke von z in Wirklichkeit eine Furche bilden, kann man an diesem Kleinhirn deutlich erkennen, da z auch im mittleren Teil von II durch einen feineren Streifen geschieden ist. III und IV sind noch auf das mittlere Drittel des Kleinhirns beschränkt. V besteht bei diesem Kleinhirn noch aus einem mittleren und zwei seitlichen Teilen. Es scheinen also auch hier wie bei der Entwicklung anderer Teile individuelle Schwankungen vorzukommen.

No. V. Embryo 9 cm lang, Kleinhirn 8 mm breit, 2½ mm lang, 3½ mm hoch.

Vor I liegen vier Furchen⁴⁾, die drei Teile von V haben sich auch hier noch nicht vereinigt. IV ist im Gegensatz zu Kleinhirn No. III besser ausgebildet als VII. Rechts ist eine kurze Furche zu erkennen, die im Begriffe ist, sich mit VI zu vereinigen. Links ist die Furchung undeutlich. Demnach entsteht VI aus einem mittleren und zwei seitlichen Teilen. IV erweckt den Anschein, als ob sie sich mit dem seitlichen Teil von V vereinigt. (Zwischen den Enden von III und IV ist jederseits eine kurze selbständige Furche bemerkbar. Bei den späteren Embryonen konnte ich dieselben nicht nachweisen.) In der Gegend von a ist links eine kurze quere Furche sichtbar, rechts ist an dieser Stelle die Zeichnung verwischt.

No. VII. Embryo 10 cm lang, Kleinhirn 8 mm breit, 3¼ mm lang, 3 mm hoch.

Vor I sind jetzt im ganzen 8 Furchen vorhanden. Zwischen I und V sind nur drei kurze Furchen bemerkbar. Da sie ungefähr gleiche Entwicklung zeigen, ist es nicht möglich VI und VII zu bestimmen. Die drei Teile vor V stehen kurz vor ihrer Vereinigung. IV ist auf der linken Seite mit V vereinigt. Auf der rechten Seite

¹⁾ Sulcus dorsocaudalis aut. ²⁾ Teil des Tuber vermis.

³⁾ Declive. ⁴⁾ Wahrscheinlich die Furchen zwischen Lingula, Lobus centralis, Lobus ascendens und Culmen.

wendet sie sich bereits nach rückwärts. Ein kleiner Furchenrest deutet hier auf einen früheren Zusammenhang mit dem seitlichen Teil von V hin. Vor II ist in der Mitte eine kurze Furche bemerkbar.

No. VIII. Embryo 12 cm, Kleinhirn $9\frac{1}{2}$ mm breit, 5 mm lang, $4\frac{1}{2}$ mm hoch.

Vor I sind nur 5 Furchen zu zählen. F hat im mittleren Teil zwei kurze Furchen erhalten. IV reicht in einem nach vorne offenen Bogen ungefähr über das mittlere Drittel der Kleinhirnbreite. Eine etwa vorhanden gewesene Vereinigung mit V, wie sie beim vorigen Embryo bestand, ist nicht mehr nachzuweisen. III hat sich bedeutend seitwärts ausgedehnt und mit der Furche x beiderseits vereinigt.

No. IX. Embryo $12\frac{1}{2}$ cm, Kleinhirn $8\frac{3}{4}$ mm breit, $3\frac{3}{4}$ mm lang, 4 mm hoch.

Dieses Kleinhirn ist gegenüber dem vorigen bedeutend in der Entwicklung vorgeschritten. Vor I sind 6 Furchen vorhanden. Es ist demnach die Furchenzahl in diesem Gebiete sehr wechselnd. Bei D—H kann man deutlich zwischen mittleren und seitlichen Teilen unterscheiden, die durch zwei seichte sagittale Vertiefungen geschieden werden. Diese Vertiefungen seien mit b bezeichnet. Die mittleren Teile von D—H will ich D_1, E_1, F_1, G_1, H_1 ¹⁾ bezeichnen, die seitlichen D_2, E_2, F_2, G_2, H_2 ²⁾. Die Furchen IV, V und VI nähern sich bei b und divergieren seitlich wieder. So entstehen bei b Einschnürungen an F und G. Die beiden Furchen y bilden hier deutlich eine zusammenhängende Furche, die das Kleinhirn nach hinten und seitwärts begrenzt. III ist hier nicht mit x verbunden. Auf der Furche a ist jederseits eine kurze quere deutliche Furche vorhanden, die mit III durch einen schräggestellten Furchenteil verbunden ist. Die ganze aus dieser Vereinigung hervorgegangene Furche mag jetzt III ³⁾ heißen. III reicht nun also bis an die mediale Grenze von L. Man kann daher von einer Verbindung zwischen C und L ⁴⁾ sprechen. C hat drei sekundäre Furchen erhalten. Furche IV hat sich vollständig von V getrennt und ist seitwärts und etwas nach rückwärts über b hinaus verlängert, ohne

¹⁾ H_1, G_1 = Declive, F_1, E_1 = Tuber vermis, D_1 = Pyramis aut. ²⁾ H_2, G_2 = Lob. lunat. ant. und posterior? F_2, E_2 = Lob. semilunar. sup. et. inf. aut., D_2 = Lob. biventer aut.

³⁾ Sulc. nasoventralis s. Fissura secunda aut. ⁴⁾ Uvula und Paraflocculus.

aber mit einer anderen Furche zu verschmelzen. D₂ und E₂ sind also seitlich noch vereinigt. An den mittleren und seitlichen Teilen sind selbständige sekundäre Furchen aufgetreten, die aber die Sagittalrinnen b¹⁾ nicht überschreiten. K hat jederseits eine Furche erhalten. Auf L sind links zwei Furchen angedeutet. Dadurch, daß sich das Kleinhirn allmählich über seine Querachse eingerollt hat, sind Teile der früheren vorderen und hinteren Flächen auf die Unterseite zu liegen gekommen. A und B sind daher nur noch durch einen schmalen Raum hier unten geschieden.

No. X. Embryo 13 cm, Kleinhirn 10 mm breit, 4 mm lang, 5 mm hoch.

Vor I ist eine fast halbkreisförmige, quer über die Vorderfläche reichende muldenförmige Vertiefung aufgetreten, die auch beim ausgewachsenen Kleinhirn vorhanden ist. Die sekundären Furchen sind deutlicher geworden. Auf L sind jederseits mehrere Furchen gut zu erkennen, es legen sich also die ersten Windungen des späteren Paraflocculus an.

No. XI. Kleinhirn 10 mm breit, 4³/₄ mm lang, 6 mm hoch.

Die Furchen sind noch deutlicher geworden. IV hat sich weiter seitlich fortgesetzt.

No. XII. Kleinhirn 9³/₄ mm breit, 5¹/₂ mm lang, 6 mm hoch.

IV²⁾ hat sich mit dem medialen Teile von r (nicht mit dem medialen Ende) vereinigt. Auch III ist hier wieder mit x vereinigt.

No. XIII. Embryo 16 cm, Kleinhirn 10¹/₂ mm breit, 6 mm hoch, 5¹/₂ mm lang.

Fläche A ist stark in vertikaler Richtung gewachsen und erreicht im medialen Teil die obere Fläche. Die mittleren und seitlichen Teile von F haben sich in sagittaler Richtung stark entwickelt. IV hat sich mit dem lateralen Teil von x vereinigt. Auch III ist wieder mit x vereinigt.

No. XIV. Kleinhirn 10¹/₂ mm breit, 6 mm lang, 6 mm hoch.

IV²⁾ vereinigt sich mit dem lateralen Teil von x.³⁾ Die seitlichen Teile von D⁴⁾ sind in sagittaler Richtung verhältnismäßig gut entwickelt.

No. XV. Kleinhirn 10 mm breit, 6¹/₂ mm lang, 7 mm hoch.

Die lateralen Teile von G⁵⁾ bleiben in der sagittalen Ausdeh-

¹⁾ Fissura paramediana aut.

²⁾ Fissura suprapyramidalis.

³⁾ Sulc. arcuatus; Fiss. sagittalis profunda aut.

⁴⁾ Lob. biventer aut.

⁵⁾ Lob. lunat. ant.

nung hinter den anderen Teilen des Kleinhirns bedeutend zurück. Im mittleren Teil hingegen ist H ziemlich breit in sagittaler Richtung. Die sich zuspitzenden seitlichen Teile schlagen sich auf die Vorderfläche um. D₂¹⁾ bildet einen schmalen, in der Tiefe unter E₂²⁾ gelegenen Streifen. III ist mit x vereinigt. L hat sich in vertikaler Richtung sehr stark entwickelt.

No. XVI. Embryo 17¹/₂ cm, Kleinhirn 11 mm breit, 8 mm lang, 8 mm hoch.

III flacht sich auf a ab, ohne sich mit x zu vereinigen. Auch II wird hier sehr flach. L bildet fast einen Halbkreis, dessen Konvexität nach oben gerichtet ist. Mehrere kurze Furchen dringen von der Peripherie nach dem Zentrum zu ein. K³⁾ hat zwei deutliche, sagittal gerichtete Furchen erhalten, die vorn am tiefsten sind und sich deshalb wahrscheinlich von vorn nach hinten eingesenkt haben.

No. XVII. Embryo 16 cm, Kleinhirn 12¹/₄ mm breit, 8 mm lang, 8 mm hoch.

Die Seitenteile von D⁴⁾ stellen einen schmalen Streifen dar, der einen nach vorn und oben offenen Bogen bildet. III ist auf a nicht festzustellen.

No. XVIII. Kleinhirn 12 mm breit, 9¹/₂ cm lang, 9 mm hoch.

A und B stoßen an der Unterfläche des Kleinhirns zusammen. Sagittalfurche b⁴⁾ hat sich bereits tief eingesenkt, sodaß die Verbindungen zwischen dem mittleren und den seitlichen Teilen von D an der Oberfläche nicht sichtbar sind. Die Seitenteile von D sind kräftig entwickelt. L hat jetzt bereits die Form eines Halbkreises⁶⁾. Die Furchen gehen wie die Speichen eines Rades nach einem Mittelpunkt, ohne denselben zu erreichen.

No. XIX. Embryo 25 cm, Kleinhirn 15¹/₂ mm breit, 12 mm lang, 11¹/₂ mm hoch.

Die Sagittalrinne b ist am hinteren Teil noch tiefer geworden. D₁, E₁ und F₁⁶⁾ bilden einen nach rechts offenen Bogen. E hat sich hierbei nach links übergelegt und liegt zum Teil über der Furche b. D₂¹⁾ ist kräftig entwickelt und in viele Blätter gespalten. Diese Blätter bilden im Zusammenhang eine Schleife, indem sie nach der Innenseite der

¹⁾ Lob. biventer aut. ²⁾ Lob. semilunar. infer. aut.

³⁾ Flocculus. aut. ⁴⁾ Fissura paramediana aut.

⁵⁾ Paraflocculus dorsalis und ventralis, Lob. cuneiformis dorsalis und ventralis. ⁶⁾ Pyramis und Tuber vermis.

Schleife spitz zulaufen und stehen mit den Blättern von L¹⁾ in ununterbrochenem Zusammenhang. Die Blätter von K²⁾ stehen zu den letzten Blättern von L ungefähr senkrecht und werden zum Teil von oben und seitlich bedeckt.

No. XX. Embryo 26 cm, Kleinhirn 16 mm breit, 12 mm lang, 11¹/₂ mm hoch.

An der Stelle von C₁, D₁ und E₁³⁾ ist infolge starken sagittalen Wachstums eine S-förmige Krümmung zustande gekommen. C₁ ist nach links, E₁ nach rechts ausgewichen und sie bedecken die Sagittalfurchen b. Die seitlichen Teile von D⁴⁾ bilden schmale Bänder, die medial aus einem quer gestellten Blättchen und lateral aus mehreren kurzen, sagittal gestellten Blättern bestehen. An letztere schließen sich die Blätter von L¹⁾ an. Das mediale, quer gestellte Blättchen einer jeden Seite schließt sich an die ebenso gestellten Blättchen von E₂⁵⁾ an. L hat links mehr die Gestalt einer nach hinten offenen Schleife, so daß man von einem dorsalen und ventralen Teil⁶⁾ sprechen kann. Rechts ist die schöne, halbkreisförmige Anordnung der Blätter von L verloren gegangen, indem infolge starken Wachstums von L einzelne Blätter nach innen oder außen ausgewichen sind.

No. XXI. Embryo 28¹/₂ cm, Kleinhirn 17 mm breit, 14 mm lang, 12¹/₂ mm hoch.

E₁ ist nach rechts gedrängt, F₁ etwas nach links.

No. XXII. Embryo 29 cm, Kleinhirn 18 mm breit, 14 mm lang, 14 mm hoch.

IV⁷⁾ hat sich in gerader seitlicher Richtung ausgedehnt und in den vordern Teil von x⁸⁾ eingesenkt. Durch die verhältnismäßig kräftige Ausbildung der seitlichsten Teile von D₂, die bei diesem Kleinhirn weit nach vorn reichen, ist L mehr nach hinten gedrängt, K ist kräftig entwickelt.

No. XXIII. Embryo 33 cm, Kleinhirn 19 mm breit, 17 mm lang, 15 mm hoch.

L zeigt bei diesem Kleinhirn ein eigentümliches Bild, wie ich es sonst bei keinem Kleinhirn gefunden habe. L. hat, von der Seite

1) Paraflocculus. 2) Flocculus. 3) Uvula, Pyramis, Tuber vermis aut. 4) Lobus biventer. 5) Lob. semilunar. infer. aut.

6) Paraflocculus dorsalis und ventralis. 7) Sulc. caudoventralis Fiss. suprapyramidalis aut. 8) Fissura sagittalis profunda s. Sulcus arcuatus.

gesehen, die Gestalt eines gefiederten Blattes. Die einzelnen Fiederblättchen haben wieder kurze radiär gestellte Furchen.

No. XXIV. Embryo $36\frac{1}{2}$ cm, Kleinhirn 22 mm breit, 17 mm lang und 15 mm hoch.

D₁ und E₂ sind vollständig aus ihrer ursprünglichen Lage gedrängt. Die Blätter von E₁¹⁾ sind sagittal gestellt, die von D₁²⁾ hauptsächlich quer, liegen aber an der rechten Seite von E₁. L der rechten Seite zeigt schöne schleifenförmige Anordnung seiner Blätter. Die Blätter von L der linken Seite sind in drei über einander gelegenen Reihen angeordnet.

Die übrigen Kleinhirne von Rinderembryonen, die mir noch zur Verfügung standen, bieten nichts Neues. Sie ähneln den ausgewachsenen Kleinhirnen, nur sind an letzteren die durch starkes Wachstum bedingten Verlagerungen und Verkrümmungen einzelner Teile noch mehr ausgeprägt. Namentlich L behält seine ehemalige Schleifenform nicht bei, sondern besteht später aus einer Anzahl schleifenförmiger Lappchen. (Vergl. Fig. 14 u. 15.)

Ich will nun noch einmal kurz die Entwicklung der einzelnen Furchen und Kleinhirnteile beim Rinde im Zusammenhang schildern.

Furche I, welche der Fissura prima der Autoren entspricht, erscheint zuerst und ist auch beim ausgewachsenen Kleinhirn am tiefsten. Sie liegt anfangs an der Vorderfläche, später kommt sie allmählich auf die obere Fläche zu liegen. Die nächste Furche, die erscheint, ist II. Sie verläuft am hinteren Rande quer über das ganze Kleinhirn bis zum vorderen Rand der Seitenflächen. Nach II³⁾ entstehen fast gleichzeitig III⁴⁾, IV⁵⁾ und V. III bleibt längere Zeit auf das mittlere Drittel der Kleinhirnbreite beschränkt, senkt sich dann in die Mulde a ein und scheint sich später stets mit x⁶⁾ zu vereinigen. Auf einer Entwicklungsstufe erscheint auf a eine kurze quere Furche, die bei einem Kleinhirn mit III verbunden war. III reichte so bis an

¹⁾ Tuber vermis. ²⁾ Pyramis, ³⁾ Sulc. praeuvularis, Fiss. postnodularis aut. ⁴⁾ Sulc. nasoventralis, Fissura secunda aut.

⁵⁾ Sulcus caudoventralis, Fiss. suprapyramidalis aut. ⁶⁾ Fissura sagittalis profunda aut.

den medialen Rand von L. Auf einer späteren Stufe war III stets mit x vereinigt, um dann schließlich wieder ebenso wie II auf a zu verschwinden. Merkwürdig ist die Entwicklung von IV¹⁾. Sie bildet zu Anfang einen nach vorn offenen Bogen, dessen Enden sich sogar mit den lateralen Teilen von V vereinigen. Etwas hinter dieser Vereinigung geht dann von IV jederseits eine Furche aus, die sich seitwärts und oft auch etwas rückwärts wendet. Ein derartiges Stadium hat auch Bradley beschrieben, aber die wahre Sachlage verkannt. Die Vereinigung zwischen IV und V verschwindet nun. IV setzt sich bald in fast gerader Linie nach seitwärts fort und vereinigt sich mit dem lateralen Teil von x, bald verläuft sie in Form eines vorn offenen Bogens und vereinigt sich dann mit dem medialen Teil von x. D₂²⁾ bildet in letzterem Falle einen schmalen bogenförmigen Streifen. x entsteht gleich zu Anfang der Furchenbildung. Daß x nicht mit IV eine Furche bildet nach ihrer Vereinigung, beweist die Tatsache, daß sie stets mehr oder weniger über die Vereinigungsstelle medialwärts hinausragt. Der letztere Teil bleibt allerdings ziemlich flach, so daß man später zuweilen nur schwer die Grenze zwischen D und L finden kann. Auch die Seitenteile von IV bleiben flach. Die Entstehung der Furchen V, VI und VII bietet nach dem bei den einzelnen Kleinhirnen Gefagten keine Schwierigkeit, so daß ich nicht noch einmal darauf einzugehen brauche. VII ist in den späteren Stadien bedeutend tiefer als V und VI.

A (Pars nasalis cerebelli d. h. Lingula; Lobus centralis, ascendens und Culmen mit ihren Alae) liegt zuerst ganz an der Vorderfläche, zeigt dann aber ein bedeutendes Wachstum in sagittaler Richtung. Auf dem Median-schnitte eines ausgewachsenen Kleinhirns nimmt A fast die Hälfte der Schnittfläche ein. H (Teil von Declive) läuft

¹⁾ Fissura suprapyramidalis aut.

²⁾ Lob. biventer aut.

nach den Seiten ziemlich spitz zu. Auch G (Teil von Declive) bleibt schmal. Dagegen wachsen die mittleren, besonders aber die seitlichen Teile von F und E (Tuber vermis) kräftig in sagittaler Richtung. An den mittleren Teilen kommt es infolgedessen zu Verlagerungen (Bogen des Tuber vermis). Die seitlichen Teile nehmen eine fächerförmige Gestalt an. D, C und B (Pyramis, Uvula und Nodulus) behalten ungefähr ihre ursprüngliche Form bei, ebenso K (Flocculus).

L (Paraflocculus) hat zuerst eine ungefähr ovale Gestalt, wächst dann besonders in vertikaler Richtung und nimmt die Form eines nach unten offenen Halbkreises und später die einer Schleife an, deren Schenkel nach hinten gerichtet sind. Letztere Form kann entweder bestehen bleiben, oder es entstehen aus ihr zwei oder drei schleifenförmige Lappen.

Bradley hat die Kleinhirne mehrerer Rinderembryonen beschrieben. Wie ich bereits erwähnt habe, hat er den wahren Charakter der Furchen IV und V verkannt. Es sind ihm jedoch noch andere Irrtümer unterlaufen. Bei seinem Rinderembryo No. I stellte er bereits die Trennung des Paraflocculus (L) in zwei Teile fest, während bei den von mir untersuchten Embryonen, die mit diesem Embryo ungefähr auf gleicher Entwicklungsstufe stehen, eine derartige Trennung noch nicht angedeutet ist. Wie aus seiner Figur ersichtlich ist, entspricht der untere Teil seines Paraflocculus (L) in Wirklichkeit dem Flocculus (K). Einen etwas hervorragenden Teil der Brücke unterhalb des Letzteren hat er als Flocculus bezeichnet. Er hat offenbar die Furche, die bei den Schafsembryonen von ihm mit IV bezeichnet worden ist und meiner Furche II entspricht, mit meiner Furche y verwechselt. Als Folge davon haben sich außer den genannten Irrtümern noch andere Verwechslungen eingestellt. Seine Figuren 11 und 20 vom Schafsembryo No. V, resp.

Rinderembryo No. III, die in der Entwicklung ungefähr gleich weit vorgeschritten sind, decken diese Verwechselungen auf. E, IV, D₂, a, D₁ und III in Fig. 11 entsprechen der Reihe nach D₂, d, D₁, III, C₃ und a. Bradley glaubte auch zwei Furchen vor I (feiner Furchen II) gefunden zu haben, die sich durch ihr früheres Erscheinen und größere Tiefe vor den andern vor I (II) gelegenen Furchen auszeichnen. Er bezeichnet sie mit I und c. Vergleicht man die beiden vorhin genannten Figuren, so findet man, daß Furchen c in Figur 11 von Bradley homolog der Furchen I in Figur 20 sein könnte.

Schafsembryonen.

No. I. Embryo 38 mm lang (Nackensteifslänge), Kleinhirn 6 mm breit.

Das Kleinhirn stellt eine quer gelegte Platte dar, die an den Enden etwas nach unten gebogen ist. Der hintere Teil der Oberfläche zeigt in der Medianlinie eine Einkerbung, die am hintern Rande am stärksten ist. Diese Einkerbung setzt sich auf die der vierten Gehirnkammer zugekehrte untere Fläche fort und wird dort tiefer. Am hintern Rande des Kleinhirns befindet sich eine lockere Masse (Adergeflecht), die durch einen Spalt vom Kleinhirn geschieden wird. Dieser Spalt setzt sich bis auf die Seitenflächen fort und entspricht y der Rinderembryonen. Furchen sind noch nicht vorhanden.

No. II. Embryo 57 mm lang, Kleinhirn 6½ mm breit.

Man kann bereits eine vordere obere, eine hintere, eine untere und zwei Seitenflächen unterscheiden. An der vorderen oberen Fläche ist eine quere, deutliche Einsenkung, die fast über die ganze Breite der Vorderfläche reicht. Sie stellt die Furchen I (Fissura prima) dar. Kurz vor dem hintern Rande des Kleinhirns ist eine Furchen, die auf die Seitenfläche umbiegt und den vorderen Rand derselben erreicht. Es ist Furchen II (Sulc. praeuvularis). Vor II ist im mittleren Teil eine kurze Furchen aufgetreten, die der Furchen III (Fiss. suprapyramidalis) entspricht. An den seitlichen Teilen der Oberfläche ist vor II jederseits eine schwache, quere Einsenkung, die dem Seitenteil der Furchen V zu entsprechen scheint. Von II, und zwar kurz bevor sie auf die Seitenfläche umbiegt, geht eine muldenförmige Vertiefung ab, die bei den Rinderembryonen b genannt wurde (Fis-

suramparamediana). In b zeigen die Querwülste zwischen I und III deutliche Einschnürungen. Die Hauptfurchen sind gut ausgeprägt. III läuft seitlich in Form einer flachen Rinne bis zum medialen Rand von L (Paraflocculus). Vom mittleren Teile von x (Fissura sagitt. profunda) geht eine Furcha medialwärts, die allmählich seichter wird und b nicht erreicht. Sie ist homolog den seitlichen Teilen von IV bei den Rinderembryonen. Die an b seitlich angrenzenden Teile (Tract. lat. I) bilden zusammen mit L und K (Paraflocculus und Flocculus) einen S-förmigen Wulst. L hat die Gestalt eines Halbkreises mit vielen radiär gestellten eben angedeuteten Furchen. Zwischen I und V ist nur eine quer über das Kleinhirn reichende Furcha, die, nach ihrem Verlauf und der Form des zwischen ihr und I liegenden Lappens zu urteilen, der Furcha VII der Rinderembryonen entspricht. An allen Teilen des Kleinhirns sind sekundäre Furchen aufzutreten.

No. IV. Embryo fast ausgetragen, Kleinhirn 23 mm breit, 15 mm hoch, 17 mm lang.

Das Kleinhirn läuft nach seitwärts und unten ziemlich spitz in den Flocculus aus. B (Nodus) ist in querer Richtung verhältnismäßig breit. Hinter I ist es an den mittleren Teilen infolge Verlagerung zu einer S-förmigen Krümmung (Bogen des Tuber vermis) gekommen. Merkwürdig ist, wie schon Kuithan nachgewiesen hat, die Konstanz in der Art der Verlagerung, indem erst ein nach links offener Bogen entsteht, an den sich dann nach hinten ein nach rechts offener Bogen anschließt.

Die Blätter von L haben sich in zwei übereinander liegenden Reihen geordnet, die nasal ineinander übergehen (Paraflocculus dorsalis und ventralis) und so eine nach hinten offene Schleife bilden. Aus der unteren Reihe sind einige Blättchen etwas nach oben ausgewichen und bilden den Lobus petrosus. Die hinteren Blättchen des dorsalen Teiles schließen sich an die Blättchen des seitlichen Teils von D (Lobus biventer) an. Es kommt so wieder eine Schlangenlinie zustande.

Die Entwicklung des Kleinhirns vom Schafe ist also durchaus ähnlich der des Rindes. Meine Befunde bei den Untersuchungen der Schafembryonen stimmen mit denen Kuithan's und Bradley's überein.

Schweineembryonen.

No. I. Kleinhirn $7\frac{1}{2}$ mm breit.

Das Kleinhirn hat ganz die Gestalt des Kleinhirns von Rinderembryonen bei Beginn der Furchenbildung, so daß ich auf die Beschreibung seiner Form nicht einzugehen brauche. Furchen I (Fissura prima) reicht über die ganze Breite der Vorderfläche. Vor I sind vier Furchen, von denen die beiden vordersten nur angedeutet sind. Die zweite vor I reicht am weitesten seitwärts und ist am besten entwickelt. II (Sulc. praeuvul.) läuft vor dem hinteren Rande über das ganze Kleinhirn. K (Flocculus) ist nach unten gegen die Brücke deutlich abgegrenzt. III¹⁾, IV²⁾ und x³⁾, sind ebenfalls vorhanden; IV ist noch nicht mit x vereinigt. Die drei Teile von V sind kurz vor ihrer Vereinigung.

No. II. Die Breite des Kleinhirns ließ sich nicht sicher bestimmen, da seine Form etwas gelitten hatte.

Vor I sind vier Furchen. Zwischen I und V sind im mittleren Teile zwei kurze Furchen aufgetreten. V besteht noch aus drei Teilen. IV bildet einen nach vorne offenen flachen Bogen und reicht nur über das mittlere Drittel des Kleinhirns.

No. III. Kleinhirn 9 mm breit, 7 mm hoch, 6 mm lang.

A ist sagittal kräftig entwickelt und reicht an die obere Fläche, so daß I zum größten Teil an der oberen Fläche liegt. Die mittleren Teile (Tractus medianus) heben sich deutlich vom Reste des Kleinhirns ab, geschieden durch b (Fissura paramediana). Die Seitenteile bilden einen Wulst, der S-Form besitzt. Es treten an allen Teilen sekundäre Furchen auf.

No. IV. Kleinhirn 11 mm breit, 6½ mm lang, 7 mm hoch.

Der Zusammenhang zwischen den mittleren und den seitlich angrenzenden Teilen ist durch die Vertiefung von b besonders im hinteren Teile undeutlich geworden. L bildet eine hinten offene Schleife, deren Schenkel durch eine seichte Rinne geschieden werden. B (Nodus) und C (Uvula) gehen seitlich in ein gemeinsames Band über, das sie mit K (Flocculus) und dem unteren Schleifenschenkel von L (Paraflocculus) verbindet. Die Furchen II besteht also nur noch zwischen B und C und zwischen L und K. IV wird seitlich flach und vereinigt sich mit dem medialen Ende von x. Da die lateralen Teile von IV und die medialen Teile von x nur flach sind, so bilden die seitlichen Teile des Kleinhirns einen fast ununterbrochen gewundenen Wulst, wie beim vorigen Kleinhirn. Zwischen I und V verläuft eine quer über das ganze Kleinhirn reichende Furchen, die der Furchen VII zu entsprechen scheint.

¹⁾ Fiss. secunda s. nasoventralis. ²⁾ Fiss. suprapyramidalis s. caudoventralis. ³⁾ Fiss. sagittalis profunda.

No. V. Kleinhirn 14 mm breit, 13 mm lang.

Es ist zu einer Krümmung der mittleren Teile hinter Furche I gekommen. Diese Krümmung zeigt eine schöne S-Form. Da die seitlich an bangrenzenden Teile einen nach außen konvexen Bogen bilden, so ist die beim vorigen Kleinhirn beschriebene Schlängelung noch komplizierter geworden.

Auch beim Schwein haben wir demnach eine Entwicklung des Kleinhirns, die der Entwicklung beim Rinde nahezu gleicht.

Kägenembryonen.

No. I. Embryo $3\frac{1}{2}$ cm lang.

Mikroskopische Serienschritte. Auf den mittleren Sagittalschnitten sind am Kleinhirn zwei seichte und kurze Furchen vorhanden, die nur auf wenigen Schnitten zu verfolgen sind. Die vordere ist die Furche I¹⁾, die hintere die Furche II²⁾. Letztere ist etwas deutlicher und auch etwas länger wie die erstere, so daß sie vielleicht früher entstanden ist als I. II entfernt sich seitlich etwas vom hintern Rande des Kleinhirns.

No. II. Embryo 4 cm lang.

Die Furchen I und II sind wieder in derselben Ausdehnung vorhanden. Am hinteren Rande des Kleinhirns befindet sich ein Anhängsel (Adergeflecht), das im mittleren Teile durch einen Spalt vollständig vom Kleinhirn abgetrennt ist. Seine seitlichen Teile heben sich vom Kleinhirn durch eine Furche ab, welche der Furche y der Rinderembryonen entspricht.

No. III. Embryo $4\frac{1}{2}$ cm lang.

Mikroskopische Schnittserie. Furche I ist bedeutend tiefer geworden. Vor I ist bereits die Andeutung einer Furche. II ist mit Sicherheit nur auf wenigen Schnitten zu erkennen. Die Furchen III und IV sind erschienen. III³⁾ ist sehr seicht und nur auf wenigen Schnitten vorhanden. IV⁴⁾ ist verhältnismäßig tief.

No. IV. Embryo 6 cm lang.

Mikroskopische Schnittserie. Vor I sind zwei tiefere Furchen und vor diesen wieder drei sehr seichte. II ist sehr deutlich geworden und reicht über das ganze Kleinhirn. III fehlt bei diesem Kleinhirn. Auf den Seitenteilen des Kleinhirns sind zwei Furchen erschienen, von denen die hintere sehr kurz ist, während sich die

¹⁾ Fiss. prima.

²⁾ Fiss. postnodularis s. Sulc. praeuvularis.

³⁾ Fiss. secunda s. Sulc. nasoventralis.

⁴⁾ Sulc. caudoventralis.

vordere etwas weiter nach der Mittellinie zu erstreckt. Diese Furchen sind x¹⁾ und V.

No. V. Embryo 7 cm lang.

Mikroskopische Schnittserie. Furchen I hat bereits sekundäre Furchen erhalten. Vor I sind sieben Furchen von verschiedener Tiefe. Furchen III ist hier deutlich vorhanden. Sie nähert sich seitlich der Furchen II und verschwindet schließlich. IV ist in der Medianebene nächst I die tiefste Furchen. Furchen x ist länger und tiefer geworden. V hat sich mehr der Medianebene genähert. Ihr mediales Ende liegt vor dem lateralen Ende von IV. Es kommt jedoch zu keiner Verschmelzung der beiden Furchen. Sie sind durch einen schmalen Wall geschieden, welcher durch diese beiden Furchen etwas in die Tiefe gezogen ist, so daß eine oberflächliche Betrachtung eine Verschmelzung derselben vortäuschen kann. Wir haben hier also einen ähnlichen oder gleichen Zustand wie bei den Rinderembryonen, bei welchen die beiden Furchen auf einer Stufe der Entwicklung verschmolzen zu sein scheinen. Ein mittlerer Teil von V, wie wir ihn bei den Rinderembryonen gefunden haben, ist nicht festzustellen, sodaß die Furchen V bei der Katze möglicherweise durch Vereinigung ihrer beiden seitlichen Teile in der Medianebene zustande kommt.

Nach Künnemann sind die beiden ersten Furchen, welche am Kleinhirn hinter Furchen I auftreten, diejenigen, welche von mir mit III und IV bezeichnet worden sind. Dieser Irrtum ist wahrscheinlich eine Folge seines lückenhaften Materials.

Wenn ich nun nach den entwicklungsgeschichtlichen Befunden der früheren Autoren, namentlich Bradley's und Kuithan's, und nach meinen eigenen Untersuchungen eine kurze zusammenfassende Darstellung der ontogenetischen Gestaltung des Kleinhirns der Hausfäuger geben darf, so lautet dieselbe, wie folgt: In der queren Platte, welche das Kleinhirn in seiner frühesten Anlage darstellt, treten zuerst 2 Querfurchen auf, von denen die vorderste, Fissura prima, (I), zeitlebens die tiefste bleibt und das Kleinhirn in einen nasalen und kaudalen Lappen teilt. Zu diesen beiden Querfurchen gesellen sich nach und nach eine größere Anzahl weiterer Furchen, durch welche die Kleinhirnoberfläche

¹⁾ Fiss. sagittalis profunda.

in eine entsprechende Zahl von Querwülsten zerlegt wird. Durch die verschiedenartige Gestaltung der Seitenteile der beiden hintersten (caudo-ventralen) Querwülste gegenüber den Seitenteilen der übrigen Querwülste kommt eine eigentümliche Umformung der Kleinhirnoberfläche zustande, welche bewirkt, daß an den Seitenteilen der Hemisphären an Stelle der queren Einteilung der Oberfläche eine wesentlich sagittale tritt.

An sämtlichen Querwülsten mit Ausnahme der beiden letzten tritt die Teilung in je einen mittleren und zwei seitliche Abschnitte in der Weise ein, daß rechts und links von den Mittelteilen (Wurm) eine sagittale Mulde sich einfenkt. Diese bleibt im vorderen Teile des Kleinhirns sehr flach, wogegen sie im hinteren Teile tiefer wird und schließlich eine sehr tiefe Sagittalfurche (*Fissura paramediana*) bildet. Die Gesamtheit der durch diese Mulde und Furche vom Wurm getrennten Seitenabschnitte der Querwülste (mit Ausnahme der beiden letzten) nenne ich auf Vorschlag von Prof. Martin *Tractus lateralis primus* (Fig. 11–17, Ia–c''). (Er reicht von den *Alae lobuli centralis* aut. bis zum *Lobulus biventer* der Autoren.) Infolge Flachbleibens der Sagittalmulde im vorderen Teile des Kleinhirns bleibt dieser Abschnitt des *Tractus lateralis primus* zeitlebens in innigerer Verbindung mit dem *Tractus medianus* als der Caudalteil. Im Dorfalteile des *Tractus lateralis* treten bei manchen Tieren durch Wachstum bedingte Verlagerungen auf, welche zu einer seitlichen Ausbiegung desselben führen, so daß bei den Fleischfressern und dem Schwein eine kräftige Schleife mit lateraler Konvexität zustande kommt, während beim Wiederkäuer und Pferd meist nur ein Wirbel von accessorischen Windungen sich ausbildet.

Wie schon erwähnt, sind am ausgebildeten Kleinhirn seitlich vom *Tractus lateralis primus* noch mehrere, aus kleinen, queren Windungen zusammengesetzte Sagittal-

wülste zu beobachten. Diese kommen, wie folgt, zustande. Der vorletzte primäre Querwulst (C) (Uvula aut.), welcher ursprünglich vom Mittelteile des drittelten durch eine Furche geschieden, seitlich davon anfänglich aber noch nicht getrennt ist (wie es auch bei den anderen Querwülsten vorkommt), bildet schon frühzeitig einen stark verdickten Seitenteil (L), den Paraflocculus, Lobi cuneiformes, der Autoren. Dieser zeichnet sich durch besonders starkes Wachstum aus, und sein ursprünglich seitlich gelegenes Ende macht eine Schwenkung nach vorne, so daß eine den Paraflocculus der Länge nach teilende, demnach im Grunde genommen als seitliche Querspalte aufzufassende Spalte sagittale Richtung erhält. Durch diese Furche wird der Paraflocculus in einen bei der sagittalen Lage des ganzen Gebildes medial bzw. dorsal gelegenen Schenkel, den Paraflocculus dorsalis, und einen lateralen bzw. ventralen Schenkel, den Paraflocculus ventralis der Autoren, geschieden. Gleichzeitig mit dieser seitlichen Verschiebung und Sagittalschwenkung löst sich der Paraflocculus immer mehr von dem zum Wurm gehörigen Mittelteile los und bleibt schließlich nur noch durch eine dünne Brücke mit demselben in Verbindung. Die beiden Schenkel des Paraflocculus gehen, da die sie trennende Furche nicht bis an dessen nasales Ende reicht, nasal in einander über. Sie werden durch eine Anzahl von accessorischen Furchen in Windungen zerlegt, welche zwar grundsätzlich von jenen des Tractus lateralis primus verschieden sind, diesen jedoch so ähnlich werden, daß sie ihnen gegenüber am ausgebildeten Kleinhirn keine besonderen Merkmale zeigen. Ich stehe daher nicht an, die beiden Schenkel des Paraflocculus in Übereinstimmung mit Martin als Tractus lateralis secundus und tertius zu bezeichnen (Fig. 11—17, II u. III).

Nun noch den letzten Querwulst, dessen Umgestaltung im großen ganzen jener des vorletzten ähnelt, mit dem

Unterschiede jedoch, daß in den Seitenteilen die Massenentwicklung eine geringere ist. Die Sagittalschwenkung dieses Seitenabschnittes (Flocculus der Autoren) und seine Loslösung vom Wurmteile des letzten primären Querwulstes beobachten wir auch hier, und da kleine accessorielle Windungen sich auch an diesem Seitenabschnitte bemerkbar machen, so nenne ich ihn mit Martin Tractus lateralis quartus (Fig. 11–17, IV). Wir kommen auf diese Weise ungezwungen zu einer auf ontogenetischem Boden stehenden Einteilung auch der Hemisphären des Kleinhirns, welche gegenüber der Bezeichnung der Hemisphärentteile mit Namen, die auf das menschliche Kleinhirn passen, den Vorzug außerordentlicher Einfachheit und Klarheit besitzt.

Die eben beschriebenen seitlichen Teile des Kleinhirns werden in ihrer Gesamtheit einschließlich des Tractus lateralis primus Hemisphären genannt.

Bevor ich auf die Einzelheiten und Besonderheiten der Hemisphärentteile bei den verschiedenen Hausfägern eingehe, will ich mich zunächst den Mittelteilen der primären Querwulste zuwenden, die in ihrer Gesamtheit gewöhnlich als Wurm, Vermis cerebelli, bezeichnet werden. Ich will statt dessen, namentlich mit Rücksicht auf die Erörterungen von Bolk (s. vorn), den Namen Tractus medianus gebrauchen.

Der Tractus medianus (Fig. 11–17, Aa–Be) ist der mächtigste der Windungszüge des Kleinhirns. Legt man einen Medianchnitt an, so sieht man, daß der centrale Markkörper (Corpus medullare) sich in zwei Hauptmarkstämme spaltet, von welchen mehrere kleinere Äste ausgehen. Der vordere Hauptstamm verläuft in nasodorsaler oder dorsaler, der hintere in caudodorsaler Richtung mit leichter Biegung nach unten. Beide geben kleinere Zweige ab und werden dadurch nach der Peripherie allmählich dünner. Die Lappen, welche durch die beiden Hauptstämme versorgt werden,

sind durch eine tiefe, ungefähr senkrechte Furche, die bis auf den Markkörper reicht und unserer Furche I (*Fissura prima*) entspricht, in zwei Gruppen *Lobus anterior* und *posterior* oder *nasalis* und *caudalis* geteilt. Ihr ventrales Ende liegt über der vierten Gehirnkammer, deren dorsale Begrenzung der Markkörper bildet.

An dem *Lobus anterior* fällt dorsal zunächst der *Fissura prima* ein größerer Lappen auf, der von dem vorderen Hauptmarkstamm versorgt wird. Er gibt meist kurz nach dem Verlassen des Markkörpers einen größeren Ast nach vorne zu ab und gabelt sich dann näher der Peripherie gewöhnlich in zwei stärkere Äste. Seiner Lage nach will ich diesen Lappen mit *Martin Lobulus nasodorsalis* nennen (Fig. 11–17, Ad).

Bei manchen Kleinhirnen weicht die Verzweigung des vorderen Markstammes von der obigen typischen Form ab, so daß man zuweilen die untere Grenze des *Lobulus nasodorsalis* nicht mit Sicherheit bestimmen kann. Beim Pferde ist der dorsale Teil des *Lobus nasodorsalis*, welcher an die *Fissura prima* stößt, sehr stark entwickelt. Er entspricht wohl sicher dem *Culmen monticuli hom.*, der davor gelegene ventrale Teil des *Lobus nasodorsalis* dem *Lobus ascendens*. Auch dieser ist beim Pferde sehr stark entwickelt. Daher die beträchtliche Ausdehnung des ganzen *Lobul. nasodorsalis*.

Außer dem Markaste des *Lobulus nasodorsalis* sind am *Lobus anterior* mehrere kleine, meist selbständig vom Markkörper abgehende Äste vorhanden, deren Zahl und Größe in umgekehrtem Verhältnis zu einander stehen. Sind wenige Äste vorhanden, dann sind die Läppchen in sagittaler Richtung breit und umgekehrt. Jedenfalls ist ihre Zahl und Form derart inkonstant, wie sich auch entwicklungsgeschichtlich herausgestellt hat, daß man von einer weiteren typischen Zergliederung des *Lobus anterior* ab-

sehen muß, waren ja doch bei den von mir untersuchten embryonalen Kleinhirnen im Anfang der Furchenbildung bald vier, bald fünf Furchen vorhanden, so daß ich es für überflüssig hielt, dieselben näher zu benennen. Ich will sie deshalb zusammen unter der Bezeichnung „Lobuli nasoven- trales“ zusammenfassen (Fig. 11–17, Aa–b). Beim Schaf und Rind schwankt die Zahl derselben zwischen zwei und vier. Jedenfalls entsprechen aber diese Lobuli nasoven- trales dem Lobus centralis und der Lingula des Menschen.

Von dem hinteren Hauptmarkaste gehen nach unten und hinten drei Markäste aus, deren Verbreitungsbezirke ich, von der vierten Gehirnkammer aus anfangend, nach ihrer Lage Lobulus ventralis (Fig. 11–17, Be), Lobulus caudoventralis (Fig. 11–17, Bd) und Lobulus caudalis (Fig. 11–17, Bc) nennen will. Sie entsprechen sicher dem Nodus, der Uvula und der Pyramis. Der Markast des Lobulus ventralis kann auch unmittelbar vom Markkörper ausgehen. Bei der Ziege haben Lobulus ventralis und caudoventralis einen gemein- samen kurzen Markstamm, bei Hund und Katze Lobulus caudoventralis und caudalis. Letzteren Fall habe ich auch

	Hund	Schwein
Lobuli nasoven- trales Alae lobul. central.	fehlen	klein
Lobulus nasodorsalis Alae lobul. ascendent	fehlen	klein
Alae lobul. culminis	mäßig stark	ziemlich groß
Lobulus caudodorsalis Declive (Sublob. I + II)	mit Lob. lunat. ant. und post. verbunden	mit Lob. lunat. ant. verbunden

bei einem Schweinekleinhirn gefunden. Den übrigen Teil des hinteren Lappens will ich unter dem Namen *Lobulus caudodorsalis* (Fig. 11—17, Bb—Ba) zusammenfassen, da eine weitere übereinstimmende Zergliederung bei den kleineren Vertretern unserer Hausfäuger (wenigstens bei Hund und Katze) nicht immer mit Sicherheit vorgenommen werden kann. Auch sind die Furchen meist nicht besonders tief. Es sind gewöhnlich vier Lappen vorhanden, welche dem Tuber vermis, Folium cacuminis, und Declive des Menschen entsprechen und die man nötigenfalls von der Fissura prima ausgehend als *Sublobulus primus secundus, tertius* und *quartus* des *Lobulus nasodorsalis* bezeichnen könnte. Im hinteren Teile des *Lobulus caudodorsalis* sind die ursprünglich quergestellten Windungen infolge starker Zunahme und Zusammendrängung aus ihrer Lage gewichen. Sie bilden meist einen starken Bogen, dessen Mittelteil mit seinem Scheitel nach rechts sieht.

Eine tabellarische Zusammenstellung des Zusammenhanges der einzelnen Teile des *Tractus medianus* mit den Seitenteilen des Kleinhirns ergibt bei Anwendung der bisher gebräuchlichsten Namen folgendes:

Schaf und Ziege	Rind	Pferd
schwach	Ziemlich kräftig	mäßig stark
stärker kräftig	„ „ verhältnismäßig schwach	sehr stark keulenförm. noch kräftiger
mit Lob. lunat. ant. u. post. verbunden	mit Lob. lunat. ant. verbunden	mit Lob. lunat. ant. u. post. verbunden

	Hund	Schwein
Tuber vermis (Sublob. III + IV)	mit Lob. lunat. post. und Lob. semilunares deutl. verb.	mit Lob. lunat. post. und beiden Lob. semilunares deutlich verbunden
Lobulus caudalis (Pyramis)	mit L. biventer verbunden	mit L. biventer deutl. verbund.
Lobulus caudoventralis (Uvula)	mit Tractus lat. II + III (Paraflocculus) verb.	mit Tract. lat. II + III verb.
Lobulus ventralis (Nodulus)	mit Tract. lat. IV Flocculus verb.	mit Tract. lat. IV verbunden
Biegung des Tuber vermis	mäßig stark nach rechts	sehr stark nach rechts

Die Windungen der Hemisphären verhalten sich wie folgt: Schon von den dorsal gelegenen Lobuli nasovertrales (Lob. centralis, ascendens und Culmen) gehen seitliche Verlängerungen (Flügel) ab (f. Tabelle), welche durch feichte Muldenbildung vor dem Tractus medianus gekennzeichnet werden. Sie stellen den Anfang, Pars nasalis, des Tractus lateralis primus dar. Am Lobulus nasodorsalis werden diese Seitenteile bedeutend länger und die Mulde (Fissura paramediana) tiefer, dementsprechend die Grenze zwischen Tractus medianus und Tract. lat. prim. deutlicher. Besonders entwickelt sind diese Seitenteile beim Pferde, wo ihre Windungen am freien Ende keulenförmig verdickt sind. Sie ziehen, wie auch bei den andern Hausfägern, je weiter nach hinten umfomehr in schiefer Richtung nach vorn und unten. Es wird diese Richtungsänderung bedingt durch die Ausdehnung des caudal davon gelegenen Anfangsteiles des Pars caudalis tract. lat. primi. Beim Pferde, wo die schiefe Stellung der Seitenwindungen besonders stark ausgeprägt ist, kommt dazu noch die ziemlich starke caudale Ausdeh-

Schaf und Ziege	Rind	Schaf
mit Lob. lunat. post. und Lob. semilun. verbunden	mit Lob. lunat. post. und Lob. semilun. verbunden	mit Lob. lunat. post. und Lob. semilunar. verbunden
mit L. biventer verbunden	mit L. biventer verbunden	mit L. biventer ver- bunden
mit Tract. lat. II + III verbunden	mit Tract. lat. II + III verbunden	mit Tract. lat. II + III verbunden
mit Tract. lat. IV verbunden	mit Tract. lat. IV verbunden	mit Tract. lat. IV verbunden
nach rechts	sehr stark nach rechts	2 Läppchen nach rechts hinausgeschoben

nung des Lobulus nasodorsalis, welcher hier die letzten Windungen zur Pars nasal. tract. lat. primi abgibt. Bei jenen Tieren, deren Pars caudalis tr. lat. prim. im Anfangsteil nicht stark entwickelt ist (Schaf, Ziege) und wo zugleich der Dorfalteil des Lobulus nasodorsalis (Culmen) nicht so weit caudal reicht, liegen die hintersten Windungen der Pars nasalis tract. lat. I weniger schief.

Die Pars caudalis tract. lat. I (Fig. 11—17, Ib bis c'') hängt mit dem Lobulus caudodorsalis und Lobul. caudalis (Declive, Tuber vermis und Pyramis) zusammen (f. Tabelle). Sie entspricht dem Lob. quadrangularis (f. L. palpiformis, L. lunat. ant. und post.) und dem Lob. eruciformis (L. semilunaris sup. et. inferior + Lob. biventer) der Autoren. Ihr Anfangsteil (Fig. 11—17, Ib, b') bildet, wie schon oben erwähnt, beim Fleischfresser und meist auch beim Schwein mit dem Nasaltücke des Endteiles (Ic) einen starken Bogen nach der Seite hin. Dieser ist maßgebend für die Formgestaltung der übrigen Seitenteile des Kleinhirns bei den genannten Tieren. Während die Kleinhirne der übrigen Hausfäuger gut ausgeprägte Seiten-

flächen haben, sind solche beim Fleischfreffer und Schweine nicht vorhanden. Das Kleinhirn hat hier vielmehr annähernd die Gestalt einer queren Spindel, deren seitliche Enden etwas nach vorn und unten gezogen sind. Martin hat den genannten Bogen f. Zt. als *Arcus lob. lat. I* bezeichnet. Im Einverständnis mit ihm möchte ich indeffen vorschlagen, diesen Namen fallen zu lassen, da auch am Ende des *Tract. lat. I* (*Lob. semilun. inf.*) bei manchen Tieren eine seitliche Ausbiegung zu beobachten ist. Beim Fleischfreffer sind Nasal- und Caudalschenkel des Bogens sehr kräftig entwickelt, der erstere immerhin etwas stärker. Beim Schwein hingegen, bei welchem der Bogen nicht immer gut ausgeprägt ist, erscheint der Caudalschenkel gegenüber dem mächtigen Nasalschenkel nur schwach. Nicht selten findet man auch beim Pferde den Bogen wohlentwickelt vor, und zwar so, daß dessen nasal-er Schenkel dicker ist als der caudale; beide sind meist in zwei bis drei Läppchen geteilt; namentlich der dünnere Caudalschenkel zeigt in der Regel eine deutliche Spaltung. Wenn der Bogen beim Pferde nicht entwickelt ist, so schließen sich einige kleine Läppchen caudal an einen dicken, dem Nasalschenkel des Bogens entsprechenden Abschnitt des *Tractus primus* an. Der Nasalschenkel dürfte im wesentlichen dem *Lob. quadrangularis* f. *palpiformis* (*Lob. lunat. ant. et. post.*) der Autoren gleichzusetzen sein, der Caudalschenkel dem *Lob. semilunaris superior*.

Das Ende der *Pars caudalis tractus lat. primi* (Fig. 11—17, c—c''), (dem *Lob. semilunaris superior et inferior* und *Lob. biventer* der Autoren entsprechend) läuft beim Fleischfreffer mit dem Caudalschenkel des Bogens beginnend, dann senkrecht abbiegend in fast gerader Richtung neben dem *Tractus medianus* ventralwärts. Beim Schwein bildet der letztgenannte Abschnitt einen stark nach außen gewölbten, rundlichen Bogen, dessen medial ziehen-

dem Endschenkel der lateral verlaufende Anfangschenkel des Tractus lat. secund. sich anlegt. Ganz ähnlich verhält es sich beim Schafe, während bei der Ziege ein mehr gerader, sagittaler Verlauf die Regel zu sein scheint. Auch beim Rinde verläuft der Endteil des Tract. lat. I im wesentlichen gerade. Er ist hier zu Beginn ziemlich breit, worauf eine Verjüngung gegen das Ende hin folgt. Beim Pferde ist das Verhalten des Endteiles des Tract. lat. I wechselnd. Oft läuft er vollkommen geradlinig und sagittal gestellt ventral. Anderemale, wenn der anliegende Teil des Tract. median. sich seitlich stark auslegt, beschreibt auch er einen Bogen nach außen, der manchmal sehr stark ist. Der Anschluß des Tract. secundus an das Ende der Pars caudalis tr. I richtet sich nach dieser verschiedenen Gestaltung.

Der Tractus lateralis secundus (Fig. 11 – 17, II), welcher dem Crus circumcludens Bolk's, dem Paraflocculus dorsalis Bradley's, Lobus cuneiformis dorsalis Anderer entspricht, schließt sich an das caudoventrale Ende des Tractus primus an und zieht beim Fleischfresser in seitlich gewölbtem Bogen nasalwärts um die Außenseite des Tractus primus, teilweise bedeckt vom Bogenstücke desselben. Beim Pferde läuft der Tractus secundus in dorsal gewölbtem Bogen dem Tractus primus entlang. Sein caudaler Schenkel ist etwas länger als der nicht so weit ventral reichende Nasalschenkel. Der scharf umbiegende Übergang des Nasalschenkels in den Tract. lateral. tertius ist beim Pferd und Fleischfresser nicht zu verkennen. — Beim Schweine zieht der caudale Anfangsteil (IIa) des Tractus secundus erst lateral wie beim Fleischfresser. An der seitlichen Kleinhirnkante angelangt, läuft dann der Tractus etwas dorsal (IIb) und dann etwa rechtwinkelig umbiegend, nasoventral (IIc). Man kann beim Schwein also drei Teile unterscheiden. Die Umbiegung des Nasalschenkels in den Tractus tertius ist manch-

mal ziemlich offen, anderemale sehr spitzwinkelig; ja es können die hier aneinanderliegenden Teile des Tract. secund. und tertius sogar verschmelzen und eine Strecke weit scheinbar einen Zug bilden (Fig. 12). — Von den Wiederkäuern zeigen Schaf und Ziege (ersteres mehr) ähnliche Verhältnisse wie das Schwein. Auch hier (Fig. 13) zuerst ein lateral laufendes Stück, dann ein dorsal ansteigender und hierauf ein nasoventral abfallender Schenkel. Zuletzt die verschieden scharf umbiegende Übergangschleife zum Tractus tertius. — In mancher Beziehung ähnlich verhält sich der Tractus secundus beim Rinderembryo und jungen Kalbe (Fig. 14). Er beginnt hier mit einem lateral verlaufenden, aus dem Caudalende des Tractus primus hervorgehenden Stücke, welches leicht S-förmig gewunden bis zur Seitenkante des Kleinhirns hinausläuft. Hier biegt der Tractus secundus craniomedial um und geht bald in scharfem Bogen in den jetzt noch fast geraden und einfach caudoventral verlaufenden Tractus tertius über. — Bei älteren Kälbern (Fig. 15) ist schon das Anfangsstück des Tractus secundus stark S-förmig gewunden. Individuelle Verschiedenheiten sind hier ziemlich häufig. Typisch scheint indeffen eine $2\frac{1}{2}$ malige Biegung des Tractus secundus zu sein. Zuerst ein dorsal gewölbter Bogen (II a), dann ein zweiter ebensolcher (II b) und zuletzt noch ein dorsal ansteigendes Stück (II c), welches in scharfer Wendung in den ebenfalls (wie beim Schaf und Schwein) S-förmig gewundenen Tractus tertius übergeht. Diese S-förmigen Windungen des Tractus secundus und tertius sind durch die Oberflächenausdehnung derselben zu erklären (s. Bolk).

Beim erwachsenen Rinde ist die eben genannte Bogenbildung häufig nicht mehr deutlich zu erkennen, da sich die einzelnen Bogenstücke in mehr oder weniger scharf umgrenzte Läppchen gefondert und den Zusammenhang dadurch verloren haben. Wenn man hier die Begrenzung des Tractus secundus feststellen will, tut man

daher am besten, den über dem stets leicht erkennbaren Tractus quartus gelegenen, meist S-förmigen Windungszug des Tractus tertius abzuzählen und das übrige zum Tractus secundus zu rechnen. Wenn allerdings auch dieser S-förmige Bogen des Tractus tertius nicht typisch, sondern nur zu $\frac{2}{3}$ oder der Hälfte entwickelt ist, kann es recht schwer sein, die Grenzschleife des Tr. secundus und Tr. tertius festzustellen.

Der Tractus lateralis tertius (Paraflocculus ventralis, Lobus cuneiformis ventralis) (Fig. 11–17, III) läuft beim Fleischfresser (Hund und Katze) caudoventral bis zum Caudalende des Tractus lateralis quartus. — Sein Mittelstück springt beim Hunde sehr stark, fast hakenförmig nach hinten vor und entspricht dem Lobus petrosus der Autoren. Beim Fohlen bildet er eine U-förmige Schleife mit caudal fehlendem Scheitel (Fig. 16). Diese hat sich beim erwachsenen Pferde zu einer Scheibe abgeflacht, deren caudal gewölbte Umrandung mit den Gyri besetzt ist (Fig. 17). Nicht selten wird diese Scheibe durch tiefe Einschnitte in zwei oder mehr Läppchen geteilt. — Beim Schwein ist der Tractus tertius S-förmig gewunden. Der erste Schenkel des S läuft caudal, der zweite cranioventral, der dritte caudoventral, um an das Caudalende des Tractus quartus anzuschließen. — Ganz ähnlich verhalten sich Schaf und Ziege. — Beim älteren Rinderembryo und jungen Kalbe läuft der Tractus tertius, wie schon bemerkt, nahezu gerade caudoventral bis zum Caudalende des Tractus quartus. Später beginnt auch er sich infolge der Zubildung neuer Querwindungen S-förmig zu schlängeln, und es sind die einzelnen Bogen des S anfangs alle deutlich zu erkennen. Später versteckt sich der letzte, an den Tractus quartus anschließende Bogen nicht selten in die Furche zwischen dem Tractus quartus und dem mittleren Bogen des Tractus tertius, sodaß er nur nach Zurückklappen des Tractus quartus in der Richtung nach unten

zu finden ist. Offenbar ist der gegenseitige Druck der neu sich anlegenden Gyri ein so beträchtlicher und im Einzelfalle verschiedener, daß dadurch das Bild der S-förmigen Windung verschoben wird. Manchmal scheint sich der S-förmige Bogen auch nur unvollkommen zu entwickeln. Und wie beim Tractus tertius, so kommt es auch hier oft zu mehr oder weniger deutlicher Sonderung des Windungszuges in mehrere Lappchen, die sich gegenseitig stark und verschieden aus der Lage drängen.

Der Tractus lateralis quartus (Flocculus) (Fig. 11—17, IV) stellt bei allen Hausfürgern einen einfachen, sagittal verlaufenden Zug von Windungen dar. Seine durch ein Markblatt hergestellte Verbindung mit dem Tractus medianus ist wie jene des Tractus tertius und secundus manchmal deutlich, anderemale kaum oder nicht mehr zu erkennen. — Beim Hunde ist der Tractus quartus nur mangelhaft entwickelt; seine wenigen Windungen laufen cranial leicht fächerförmig auseinander. Beim Schwein und Wiederkäuer (Rind, Schaf, Ziege) bilden sie einen kräftigen, craniodorsal sich aufbiegenden Wulst mit annähernd radiär oder schief gestellten Gyri. — Beim Pferde hingegen stellt der Tractus quartus einen kleinen, unregelmäßigen, meist in zwei Lappchen gespaltenen Wulst dar, dessen Windungen nach verschiedenen Seiten schauen.

Wie obige Ausführungen wohl beweisen, kann man mit Hilfe der neuen Namen eine klare und übersichtliche Einteilung des Kleinhirns unserer Hausfürgern aufstellen. Ich möchte daher der Anregung Martin's, die jetzt gebräuchlichen Namen des menschlichen Kleinhirns in der Haustier-Anatomie nicht mehr zu verwenden, Erfolg wünschen, besonders auch deshalb, weil durch die bei den einzelnen Autoren abweichende Art der Übertragung dieser Namen die größte Verwirrung in der Nomenklatur des Kleinhirns entstanden ist. Die Tabelle mit den verschiedenen Namen

erläutert dies zur Genüge. Die angeführten indifferenten Namen eignen sich am besten zur Bezeichnung der Kleinhirnteile, da deren Form bei den einzelnen Säugetierarten immerhin beträchtliche Abweichungen zeigt. Sobald man auf die Gestalt derselben sich beziehende Namen wählt, kommt man wie bei den Knochen des Carpus und Tarsus in die Gefahr, fast für jede Tierart andere Bezeichnungen aufstellen zu müssen, wenn man nicht in Kauf nehmen will, daß diese Namen bei den meisten Säugetieren unzutreffend sind. Bemerken möchte ich noch, daß ich auf die Furchen des Kleinhirns hier nicht näher eingegangen bin, da hierüber gelegentlich anderwärts berichtet werden soll.

Zum Schluß gestatte ich mir, Herrn Prof. Dr. Martin für seine Anleitung und fortwährende Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Erklärung der Bezeichnungen auf Tafel I und II.

- Aa—Ad. Lobus medianus nasalis.
Aa, b. Lobuli nasoventrales.
Ac, d. Lobulus nasodorsalis.
Ba—Be. Lobus medianus caudalis.
Ba, b. Lobulus caudodorsalis.
Bc. " caudalis.
Bd. " caudoventralis.
Be. " ventralis.
Ia—c". Tractus lateralis primus.
Iaa'. Pars nasalis desselben.
Ib,b'. " caudalis " Anfangsteil.
Ic—c". " caudalis " Endteil.
IIa—c. Tractus lateralis secundus.
IIIa—c. " " tertius.
IV. " " quartus.

Das übrige siehe Tabelle S. 34—39.

Fig. 4.


Kleinhirn eines 10 cm langen Rinderembryo
Caudalseite.

Fig. 5.


Kleinhirn eines 15 cm langen Rinderembryo
Caudalseite.

Fig. 6.


Kleinhirn eines 15 cm langen Rinderembryo
rechte Seite.

Fig. 7.


Medianschnitt durch das **Kleinhirn des Hundes**.
Halbschematisch.

Fig. 8.


Medianschnitt durch das **Kleinhirn des Schweines**.
Halbschematisch.

Fig. 9.


Medianschnitt durch das **Kleinhirn des Rindes**,
Halbschematisch.

Fig. 10.


Medianschnitt durch das **Kleinhirn des Pferdes**.
Halbschematisch.

Fig. 11.


Kleinhirn des **Hundes** von der rechten Seite.

Fig. 12.


Kleinhirn des **Schweines** von der rechten Seite.

Fig. 13.


Kleinhirn des **Schafes** von der rechten Seite.

Fig. 14.


Kleinhirn des **Kalbes** von der rechten Seite.

Fig. 15.

Kleinhirn des **Rindes** von der rechten Seite.

Fig. 16.


Kleinhirn des **Fohlen** von der rechten Seite.

Fig. 17.

Kleinhirn des **Pferdes** von der rechten Seite.

Literaturverzeichnis.

1. Flatau und Jacobsohn: Handbuch der Anatomie und vergleichenden Anatomie des Zentralnervensystems der Säugetiere.
 2. Charnock Bradley: On the Cerebellum of the horse.
 3. Ibid.: The Mammalian Cerebellum. (Journ. Anat. and Physiol. Vol. XXVII. 1903).
 4. Dexler: Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues des Zentralnervensystems der Ungulaten. Morph. Jahrbuch. Bd. XXXII. S. 304.
 5. Kuithan: Die Entwicklung des Kleinhirns bei den Säugetieren. (Inaugural-Dissertation. 1895)
 6. Künne mann: Über die Morphologie des Kleinhirns bei den Säugetieren. (Inaugural-Dissertation. 1895.)
 7. Elliot Smith: On the Primari Subdivision of the Mammalian Cerebellum. (Journ. of Anat. and Phys. Vol. XXXVI. 1902.)
 8. Ibid.: Notes on the Morphologie of the Cerebellum.
 9. Ibid.: Further Observations on the Natural Mode of Subdivision of the Mammalian Cerebellum. (Anat. Anz Bd. XXXIII. 1903)
 10. Ziehen: Das Zentralnervensystem der Monotremen und Marsupialier. (Denkschriften der medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. 1897.)
 11. Louis Bolk: Hauptzüge der vergleichenden Anatomie des Cerebellum der Säugetiere mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Kleinhirns.
 12. Martin: Vorschläge zur Bereinigung der veterinäranatomischen Nomenklatur. Nicht veröffentlicht.
 13. Berliner, Beiträge zur Histologie und Entwicklungsgeschichte des Kleinhirns. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. 66, 1905.
-

Lebenslauf.

Am 14. April 1877 wurde ich, Friß Arthur Freitag, in Hüttchen, Kreis Czarnikau, als Sohn des Gutsbesitzers Wilhelm Freitag, evangelischer Konfession, geboren. Den ersten Schulunterricht erhielt ich in der Dorfschule meines Heimatsortes, kam mit 10¹/₂ Jahren auf das Gymnasium zu Schneidemühl und erhielt daselbst Ostern 1898 das Reifezeugnis. Ich studierte nun an der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin und bestand dort im Anfang des 6. Semesters die naturwissenschaftliche Prüfung. Mit Beginn des Wintersemesters 1901/02 bezog ich die Tierärztliche Hochschule zu Hannover und erhielt dort im Januar 1903 die Approbation. Von Ende März bis 31. Dezember desselben Jahres übte ich die tierärztliche Praxis in Bobersberg aus und war dann bis Anfang April 1904 als Hilfstierarzt am Schlachthofe zu Elbing. Seit dem 22. April bin ich am veterinär-anatomischen Institut der Universität Gießen mit der Anfertigung der Dissertation beschäftigt gewesen.
